

パンデミックと死者数
20世紀以降のパンデミックはすべて「呼吸器感染症」

結核予防会の活動

- 外国人の方へ For Foreigners
- 結核の知識 Knowledge on TB
- HPはこちらからチェック！ https://www.jatahq.org/about_tb/qa#foreigner
- 対応言語 Available Languages
- 複十字シール運動 DOUBLE-BARRED CROSS SEALS CAMPAIGN 8月1日～12月31日
- 結核予防会では、「結核のない世界」をつくるため、複十字シール運動による募金活動を実施しています。収益金は、結核予防の普及啓発活動、開発途上国への結核対策支援に活用しています。
- 複十字シール募金にご協力ください Your donation is welcome.
- 結核予防会 寄附 検索 シールはるよ
0120-416864
- ※募金は、運動期間外でも受け付けています。
- DOUBLE-BARRED CROSS SEALS 2024 JAPAN ANTITUBERCULOSIS ASSOCIATION Designed by Tetsu Asai
- 外国人結核電話相談 Telephone Consultation Service
- TEL 03-3292-1219 問い合わせ時間 毎週火曜 (Tuesday only) 10:00 -12:00 / 13:00 -15:00
- このパンフレットについてのお問い合わせは こちらまでお願いいたします。
- 〒101-0061 東京都千代田区神田三崎町1-3-12 公益財団法人結核予防会 普及広報課
- TEL 03-3292-9288 e-mail:fukyu_hq@jata.or.jp
- このパンフレットは複十字シール募金で作られています。

正しく知ろう

結核の常識 2024

「昔の病気」ではないよ

結核・呼吸器感染症予防週間 9/24 > 9/30

シールぼうや 複十字シール運動 イメージキャラクター

JATA | 3 結核予防

私たちは持続可能な開発目標(SDGs)を支援しています。

結核とはどんな病気？

結核とは、結核菌によって主に肺に炎症が起きる病気です。最初は風邪に似た症状で始まりますが、下記のいずれかにあてはまる場合には早めに受診しましょう。 / なるほど

注意！ タンのからむ咳・微熱・身体のだるさが2週間以上続いている

咳 微熱 身体のだるさ

結核になりやすい人は？

- 喫煙習慣がある人
- 結核高蔓延国から来た外国出生者
- HIV感染や免疫の弱い人
- 糖尿病の人
- 人工透析を受けている人
- ステロイドホルモンを使用している人
- 胃潰瘍、胃の手術をした人

こんな症状にも注意！

- 体重が減ってきた
- なんとなく食欲がない
- 近頃、寝汗をかいている

特に高齢者は、症状が出なくても毎年、胸部X線検査を受けましょう

今でも1日に28人の新しい患者が発生し、5人が命を落としている日本の重大な感染症です。

結核は感染するの？

うつるんだ

くしゃみや咳

患者 周囲の人

水分を失い軽くなる（その大きさは数ミクロン）

粘液の水分

結核菌 飛沫核（数ミクロンの大きさ）

POINT!

- 1 感染してもすべて的人が発病するわけではありません。健康であれば、多くは免疫の働きによって結核菌を抑え込んでしまいます。
- 2 加齢や病気などで免疫力が落ちると、抑え込まれていた結核菌が再び活動をはじめ、発病することがあります。
- 3 感染しても発病していない潜在性結核感染症の人は、結核の薬を3ヶ月から6ヶ月間飲むことで発病を予防できます。

正しく知ってしっかり予防しよう！ シールぼうやの結核講座

結核は予防できるの？

健康的な生活が免疫力を高め、結核の予防につながります。また、早く見つけることが重症化を防ぎ、周囲への感染を予防します。症状がなくても、定期的に健診を受けましょう。

① 適度な運動
② 十分な睡眠
③ バランスの良い食事
④ タバコを吸わない
⑤ 定期的な健診

結核は治せるの？

抵抗力の弱い赤ちゃんは、結核に感染すると重症になりやすく、予防にはBCG接種が有効です。市町村からの案内に従い生後5ヶ月から8ヶ月の間に接種してください。

① 治療が確実に行われるよう、入院中も退院後も医療機関と保健所が協力して服薬を見守ります。これを日本版DOTS（ドツツ・直接服薬確認法）といいます。

② 結核の治療費用は、届け出することで公的負担が受けられます。治療を含め結核に関するご配慮については近くの保健所にご相談ください。

日本と世界の結核

日本の結核の現状

日本では、今でも1年に1万人以上結核を発症しています。

新登録患者数 ^(※1)	10,235人
罹患率 ^(※2)	8.2
死亡者数	1,664人
死亡率 ^(※3)	1.4

高齢者の結核

結核を発病した人の約4割が80歳以上の高齢者です。

外国生まれの患者の結核

結核を発病した人の約1割が外国生まれの患者です。20～29歳では7割が外国生まれです。

世界の結核の現状

世界では、総人口の約4分の1が感染しています。

新たな発病者数	1,060万人
多剤耐性結核またはリファンビシン耐性結核患者数	41万人
死亡者数	130万人

重複感染

結核はHIV感染者の大きな死因の1つです。

多剤耐性結核

薬が効かない多剤耐性結核が問題となっています。多剤耐性結核患者からの感染や服薬を中断することによって発生します。

低・中所得国に多く発生

結核患者の多数は低・中所得国から発見されています。

START!

1 結核とはどんな病気？

結核とは、結核菌によって主に肺に炎症が起きる病気です。最初は風邪に似た症状で始まりますが、下記のいずれかにあてはまる場合には早めに受診しましょう。 / なるほど

注意！ タンのからむ咳・微熱・身体のだるさが2週間以上続いている

咳 微熱 身体のだるさ

結核になりやすい人は？

- 喫煙習慣がある人
- 結核高蔓延国から来た外国出生者
- HIV感染や免疫の弱い人
- 糖尿病の人
- 人工透析を受けている人
- ステロイドホルモンを使用している人
- 胃潰瘍、胃の手術をした人

こんな症状にも注意！

- 体重が減ってきた
- なんとなく食欲がない
- 近頃、寝汗をかいている

特に高齢者は、症状が出なくても毎年、胸部X線検査を受けましょう

今でも1日に28人の新しい患者が発生し、5人が命を落としている日本の重大な感染症です。

2 結核は感染するの？

うつるんだ

くしゃみや咳

患者 周囲の人

水分を失い軽くなる（その大きさは数ミクロン）

粘液の水分

結核菌 飛沫核（数ミクロンの大きさ）

POINT!

- 1 感染してもすべて的人が発病するわけではありません。健康であれば、多くは免疫の働きによって結核菌を抑え込んでしまいます。
- 2 加齢や病気などで免疫力が落ちると、抑え込まれていた結核菌が再び活動をはじめ、発病することがあります。
- 3 感染しても発病していない潜在性結核感染症の人は、結核の薬を3ヶ月から6ヶ月間飲むことで発病を予防できます。

3 結核は予防できるの？

健康的な生活が免疫力を高め、結核の予防につながります。また、早く見つけることが重症化を防ぎ、周囲への感染を予防します。症状がなくても、定期的に健診を受けましょう。

① 適度な運動
② 十分な睡眠
③ バランスの良い食事
④ タバコを吸わない
⑤ 定期的な健診

4 結核は治せるの？

抵抗力の弱い赤ちゃんは、結核に感染すると重症になりやすく、予防にはBCG接種が有効です。市町村からの案内に従い生後5ヶ月から8ヶ月の間に接種してください。

① 治療が確実に行われるよう、入院中も退院後も医療機関と保健所が協力して服薬を見守ります。これを日本版DOTS（ドツツ・直接服薬確認法）といいます。

② 結核の治療費用は、届け出することで公的負担が受けられます。治療を含め結核に関するご配慮については近くの保健所にご相談ください。

5 日本と世界の結核

日本の結核の現状

日本では、今でも1年に1万人以上結核を発症しています。

新登録患者数 ^(※1)	10,235人
罹患率 ^(※2)	8.2
死亡者数	1,664人
死亡率 ^(※3)	1.4

高齢者の結核

結核を発病した人の約4割が80歳以上の高齢者です。

外国生まれの患者の結核

結核を発病した人の約1割が外国生まれの患者です。20～29歳では7割が外国生まれです。

世界の結核の現状

世界では、総人口の約4分の1が感染しています。

新たな発病者数	1,060万人
多剤耐性結核またはリファンビシン耐性結核患者数	41万人
死亡者数	130万人

重複感染

結核はHIV感染者の大きな死因の1つです。

多剤耐性結核

薬が効かない多剤耐性結核が問題となっています。多剤耐性結核患者からの感染や服薬を中断することによって発生します。

低・中所得国に多く発生

結核患者の多数は低・中所得国から発見されています。

みんなで正しく知ろう