

化学肥料施用量及び化学合成農薬成分回数の慣行基準

2016年3月18日

作 目	作 型 等	は種又は 移植時期 (目安)	化学肥料施用量 (窒素成分量:kg/10a)	化学合成農薬 の 成分使用回数
水稻	早植栽培	～5月20日	8	16
	普通植栽培	5月21日～	7	14
二条大麦		10下～11中	7	5
六条大麦		10下～11中	7	5
小麦	製粉用	10下～11中	7	5
	醸造用	10下～11中	13	5
大豆		6中～下	2	11
そば		8中～9上	2	
はとむぎ		5上～下	13	6
さといも		3下～4上	22	3
ばれいしょ		3中	10	2
かんしょ		5中	2	1
ジネンジョ			22	7
いちご	促成	8上～9下	20	52
	促成(長期どり)	7中～8上	40	41
トマト	促成(冬春どり)	8下～9下	30	34
	普通(夏秋どり)	1上～2上	30	22
なす	促成	7上～8上	45	47
	半促成	11上～12上	44	25
	普通(夏秋どり)	2上～下	35	34
きゅうり	促成(冬春どり)	9上～12上	40	50
	半促成(初夏どり)	1上～3上	35	28
	普通(夏秋どり)	3上～4上	30	36
	抑制(秋どり)	7上～8下	15	26
メロン			11	24
かぼちゃ		3上～4上	8	5
すいか		2下～	20	12
にがうり			27	8
ズッキーニ		4上～5中	25	8
だいこん	春どり	11下～1上	15	5
	夏どり	5下～7下	18	6
	秋冬どり	8下～9中	16	8
かぶ		1下～6中	7	6
にんじん	秋冬どり	7下～8上	13	11
ごぼう	秋どり	3下～5中	23	5
にら			35	24
ねぎ	夏どり	2下～3下	15	18
	冬春どり	3下～4中	20	16
たまねぎ		9上	22	17
らっきょう		9中	12	6
はくさい	春どり	1上～1下	17	6
	秋冬どり	8中	19	12
キャベツ	初夏どり	9下～2下	15	12
	秋冬どり	6中～7中	17	12
ほうれんそう	夏どり	5下～8下	18	8
	冬春どり	10上～11下	17	8
レタス	秋冬どり	8上～9上	15	12
	春どり	9上～1中	18	8
しゅんぎく	冬春どり	9下～10下	30	16
なばな類			21	1
ブロッコリー	春夏どり	3上～4中	22	8
	秋どり	7上～8下	22	10
カリフラワー	秋どり	7中	16	4
うど		4中～5中	12	9
アスパラガス			34	20
ふき			10	2
にんにく			24	18
しょうが		4中～4下	22	19
スイートコーン		3上～5中	23	4
さやえんどう			8	3
えだまめ	露地	5中～7下	9	7
オクラ		5上～5下	18	4
なし	露地		20	41
ぶどう	露地		8	26
	ハウス		8	16
りんご	露地		6	48
もも	露地		10	26
おうとう	雨よけ		8	22
うめ	露地		10	9
くり	露地		15	7
ブルーベリー	露地		3	5
きく	スプレー		16	17
	輪ぎく		22	38
カーネーション			29	36
ばら	土耕		26	44
りんどう			20	15
トルコギキョウ			4	17
ゆうがお	露地	3下～4上	30	12
こんにゃく		5中～6上	14	9
茶			46	12
飼料用とうもろこし		4下～6下	8	4
イタリアンライグラス		9下～10下	9	1