

(6) 花き

作物名	栽培型及び作型	品種名	栽 植 様 式	作型模式図											
				1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
きく	施設ぎく(周年)	神馬 精興の誠 精興光玉 その他	直挿し無摘心栽培 条間45cm×2条植 株間6~8cm												
	露地ぎく	サマーイエロー その他	条間45cm×2条植 株間6~8cm												
	スプレーぎく(周年)	モナリザ セイ化リレーミダス その他	直挿し無摘心栽培 ベッド幅100cm 12×12cm 8条植												
カーネーション	スタンダード(周年)	モンテスマ その他	ベッド幅90cm 24×12cm 6条植												
	スプレー(周年)	テッソ系 その他	ベッド幅90cm 24×12cm 6条植												
りんどう	露地	極早生 早生 中生 晩生	ベッド幅70cm 条間30cm×2条植 株間20cm												
	半促成	極早生 早生													
スターチス	施設	ハイブリット系	ベッド幅80cm 条間40cm×2条植 株間40cm												
ばら	施設周年	レッドスター7ハランチェ その他	ベッド幅60~65cm 条間35~40cm×2条植 株間30~35cm												

目標収量 (本/10a)	適正 pH	施肥量 (kg/10a)							成分 合計	堆 肥 及 び 土 づ くり 資 材 等 の 施 用 例	備 考	
		成分	基肥	追肥(回)								成分 合計
				1	2	3	4	5				
30,000		N	15	5	5				25	<ul style="list-style-type: none"> <li>モミガラ牛ふん堆肥を1,000kg施用する。【この場合、左の基肥から窒素：1.7kg リン酸：9.3kg 加里：8.9kgを差し引く。】</li> <li>苦土炭カルを土壤診断結果に基づき施用する。</li> </ul>	施設は年間数回 転の作付となるため、年一回は 土壤分析を行う。	
30,000	5.5 ~ 6.5	P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	15	5	5			25				
30,000		K <sub>2</sub> O	15	5	5			25				
108,000		N	20	3	3	3	3	3	41	<ul style="list-style-type: none"> <li>モミガラ牛ふん堆肥を1,000kg施用する。【この場合、左の基肥から窒素：1.7kg リン酸：9.3kg 加里：8.9kgを差し引く。】</li> <li>苦土炭カルを土壤診断結果に基づき施用する。</li> </ul>		
105,000	6.0 ~ 6.5	P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	20	3	3	3	3	41				
105,000		K <sub>2</sub> O	20	3	3	3	3	41				
30,000		N	15	5					20	<ul style="list-style-type: none"> <li>モミガラ牛ふん堆肥を3,000kg施用する。</li> </ul>	堆肥は、土づくり資材として、初年度のみの投入とする	
35,000	5.0 ~ 6.0	P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	20	5				20				
35,000		K <sub>2</sub> O	15	5				20				
20,000	6.0 ~ 6.5	N	15	3					18	<ul style="list-style-type: none"> <li>モミガラ牛ふん堆肥を2,000kg施用する。</li> <li>苦土炭カルを土壤診断結果に基づき施用する。</li> </ul>	堆肥及び苦土炭カルは、土づくり資材として、初年度のみの投入とする。	
20,000		P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	15	3				18				
20,000		K <sub>2</sub> O	15	3				18				
105,000	6.0 ~ 6.5	N	15	10	10	10	10	10	75	<ul style="list-style-type: none"> <li>モミガラ牛ふん堆肥を1,000kg施用する。【この場合、左の基肥から窒素：1.7kg リン酸：9.3kg 加里：8.9kgを差し引く。】</li> <li>苦土炭カルを土壤診断結果に基づき施用する。</li> </ul>		
105,000		P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	30	12	12	12	12	102				
105,000		K <sub>2</sub> O	15	10	10	10	10	75				

作物名	栽培型 又は 作 型	品種名	栽 植 様 式	作型模式図												
				1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	
ゆり	刈エンル系	ソルボンヌ シベリア その他	ベッド幅150cm 条間25cm×6 条植 株間12~15cm	↑ ×					□							
	アジアティック系	モナ ギロンデ その他	ベッド幅140 ~160cm 10~12条植	↑ ×					□							
デル フイニ ウム	施設	シネンシス 系 そ の 他	ベッド幅90cm 条間18cm×5 条植 株間18cm							○					①	
トル コギキ ョウ	施設	早 生 系 中 生 系	ベッド幅90~ 100cm 株間12~15cm													①
シク ラメン	3号鉢	パーパーク ビクトリア パステル系 そ の 他														
	5号鉢	パーパーク ビクトリア パステル系 そ の 他														
	6号鉢	パーパーク ビクトリア パステル系 そ の 他														
アジ サイ 赤	施設	きらきら星														
アジ サイ 青	施設	きらきら星														
ファ レノ ブシ ス	施設	ナポレオン ビーナス そ の 他														

● 鉢上げ (冷) 冷房室

目標収量 (本/10a)	適正 pH	施肥量 (kg/10a)				堆 肥 及 び 土 づ くり 資 材 等 の 施 用 例	備 考	
		成分	基肥	追肥 (回)				成分 合計
				1 回	2 回			
15,000	6.0 ~ 6.5	N P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> K <sub>2</sub> O	10 10 10			10 10 10	<ul style="list-style-type: none"> <li>・落ち葉堆肥を2,000kg施用する。</li> <li>【この場合、左の基肥から窒素：4.2kgりん酸：2.0kg加里：7.2kgを差し引く。】</li> <li>・苦土炭カルを60kg施用する。</li> </ul>	微量要素欠乏がやすいので注意する。
		N P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> K <sub>2</sub> O	12 12 12			12 12 12		
60,000	5.5 ~ 6.0	N P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> K <sub>2</sub> O	10 40 20	5 5 20 20 10 10		20 80 40	<ul style="list-style-type: none"> <li>・モミガラ牛ふん堆肥を2,000kg施用する。</li> <li>【この場合、左の基肥から窒素：3.4kgりん酸：18.6kg加里：17.8kgを差し引く。】</li> </ul>	
		N P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> K <sub>2</sub> O	10 10 10	2 2		12 10 12		
40,000	6.5 ~ 7.0	N P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> K <sub>2</sub> O	10 10 10			12 10 12	<ul style="list-style-type: none"> <li>・落ち葉堆肥を2,000kg施用する。</li> <li>【この場合、左の基肥から窒素：4.2kgりん酸：2.0kg加里：7.2kgを差し引く。】</li> </ul>	
		N P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> K <sub>2</sub> O	10 10 10			12 10 12		
	6.0 ~ 6.5						<ul style="list-style-type: none"> <li>・重焼りん、ようりんを施用する。</li> </ul>	簡易栄養診断参照 用土配合例 赤玉土 4 腐葉土 4 ピートモス 2 気相率20~25%
	6.0 ~ 6.5						<ul style="list-style-type: none"> <li>・重焼りん、ようりんを施用する。</li> </ul>	簡易栄養診断参照 用土配合例 赤玉土 4 腐葉土 4 ピートモス 2 気相率20~25%
	6.0 ~ 6.5						<ul style="list-style-type: none"> <li>・重焼りん、ようりんを施用する。</li> </ul>	簡易栄養診断参照 用土配合例 赤玉土 4 腐葉土 4 ピートモス 2 気相率20~25%
	6.0 ~ 6.5							<ul style="list-style-type: none"> <li>【用土】赤玉土4調整ピート2腐葉土2</li> </ul>
	5.5 ~ 6.0							<ul style="list-style-type: none"> <li>【用土】赤玉土5調整ピート3.5腐葉土1.5</li> </ul>
	6.0 ~ 6.5							<ul style="list-style-type: none"> <li>植え込み資材はパークとする。</li> </ul>