

大豆病害虫の見分け方

病害虫による茎葉の黄化、萎凋、早期落葉



茎葉の
黄化
・
萎凋
・
早期
落葉



地際部の被害

かび・腐敗



黒根腐病



茎疫病など

コガネムシ類幼虫による根の食害




正常な根



被害を受けた根



コガネムシ類幼虫



オオクロコガネ



ヒメコガネ

根の被害

ダイズシストセンチュウによる被害



シストの着生した根



レモン型の
シスト (0.5mm)



《参考》茎・葉柄の被害

ダイズクキタマバエ幼虫による被害



葉柄基部の黒変



葉柄内のクキタマバエ幼虫

対策は農作物等病害虫雑草防除指針を参照

病害虫による被害粒

病害

紫斑病菌による被害



紫斑粒



へその病斑

ウイルスによる被害



褐斑粒（モザイク病）



アブラムシ類により媒介

吸実性カメムシ類による被害



吸汁痕



ホソヘリカメムシ



アオクサカメムシ

虫害

チョウ目幼虫による被害



虫害粒（食害）



マメシンクイガ（老齡幼虫）と脱出痕



チョウ目幼虫

フタスジヒメハムシ成虫による被害



黒斑粒と莢の食害痕



フタスジヒメハムシ成虫