

水稻 定点の再生稲による黄萎病、縞葉枯病の発生状況

単位: %

調 査 場 所	黄萎病	縞葉枯病	備 考 (調査月日)
県全体発生ほ場率	0.0	81.3	調査ほ場数: 64 調査日: 9月24日～10月8日 300株調査 ※ 平年値はH28～R7年の10カ年平均 ※ 平年比=(発生株率/平年値)×100 ※ 調査株数にカウントされるほどではないが、ほ場内で発生が見られる場合は散見として発生ほ場数にカウント ※ 巡回調査時に耕起後または再生稲未生長の定点は定点の周辺ほ場で調査
平年値	1.2	70.7	
平年比	-	114.9	
発生程度	少	平年並	
県全体発病株率	0.0	4.3	
平年値	0.1	4.9	
平年比	0.0	87.8	
発生程度	少	平年並	
概 評	少	平年並	

イネカメムシ再生稲・畦畔等すくい取り調査結果

		イネカメムシ合計			備考
			幼虫	成虫	
発 生 ほ 場 率 (%)	発生ほ場数(か所)	4	2	2	・ 総調査ほ場数: 64ほ場 ・ 20回振りすくい取り ・ 平年値はR6(2024)年、R7(2025)年の2年の平均値
	発 生 ほ 場 率 [A] (%)	6.3	3.1	3.1	
	発生ほ場率平年値 [B] (%)	15.6	1.6	15.6	
	([A] / [B]) × 100	40.4	193.8	19.8	
	発生程度	やや少	多	少	
発 生 頭 数 (頭)	すくい取り頭数合計(頭)	4	2	2	
	すくい取り頭数平均値 [C] (頭)	0.06	0.03	0.03	
	すくい取り頭数平年値 [D] (頭)	0.36	0.11	0.30	
	([C] / [D]) × 100	16.7	27.3	10.0	
	発生程度	少	やや少	少	
概 評		やや少	やや多	少	

○地域別巡回調査結果

		イネカメムシ合計			備考
			幼虫	成虫	
県 北 発 生 ほ 場 率 (%)	発生ほ場数(か所)	0	0	0	・ 調査ほ場数: 26ほ場
	発 生 ほ 場 率 [A] (%)	0.0	0.0	0.0	
	発生ほ場率平年値 [B] (%)	3.8	0.0	3.8	
	([A] / [B]) × 100	0.0	-	0.0	
	発生程度	少	少	少	
県 北 発 生 頭 数 (頭)	すくい取り頭数合計(頭)	0	0	0	
	すくい取り頭数平均値 [C] (頭)	0.00	0.00	0.00	
	すくい取り頭数平年値 [D] (頭)	0.01	0.01	0.01	
	([C] / [D]) × 100	0.0	0.0	0.0	
	発生程度	少	少	少	
県 中 発 生 ほ 場 率 (%)	発生ほ場数(か所)	3	2	1	・ 調査ほ場数: 22ほ場
	発 生 ほ 場 率 [A] (%)	13.6	9.1	4.5	
	発生ほ場率平年値 [B] (%)	6.7	2.3	6.7	
	([A] / [B]) × 100	203.5	395.3	67.8	
	発生程度	多	多	平年並	
県 中 発 生 頭 数 (頭)	すくい取り頭数合計(頭)	3	2	1	
	すくい取り頭数平均値 [C] (頭)	0.14	0.09	0.05	
	すくい取り頭数平年値 [D] (頭)	0.34	0.16	0.18	
	([C] / [D]) × 100	40.1	56.8	25.3	
	発生程度	やや少	やや少	やや少	
県 南 発 生 ほ 場 率 (%)	発生ほ場数(か所)	1	0	1	・ 調査ほ場数: 16ほ場
	発 生 ほ 場 率 [A] (%)	6.3	0.0	6.3	
	発生ほ場率平年値 [B] (%)	43.8	0.0	43.8	
	([A] / [B]) × 100	14.3	-	14.3	
	発生程度	少	少	少	
県 南 発 生 頭 数 (頭)	すくい取り頭数合計(頭)	1	0	1	
	すくい取り頭数平均値 [C] (頭)	0.06	0.00	0.06	
	すくい取り頭数平年値 [D] (頭)	18.37	0.00	18.37	
	([C] / [D]) × 100	0.3	-	0.3	
	発生程度	少	少	少	

いちご(本ほ)

単位: %

		炭疽病	灰色か び病	うどん こ病	萎黄病	アブラ ムシ類	ハダニ 類	コナジ ラミ類	ハスモ ンヨト ウ幼虫	シロイ チモジ ヨトウ 幼虫	備考
ほ 場 率	発生ほ場数	3	0	10	0	2	20	6	4	0	総調査ほ場数: 63か所 総調査株数: 1,575株 (調査株数 25株) ※本年値＝本年の地点ごとの調査結果の平均値を示す ※周年比＝(本年値／周年値)×100 ※調査株数にカウントされるほどではないが、ほ場内で発生が見られる場合は散見として発生ほ場数にカウント
	本年値	4.8	0.0	15.9	0.0	3.2	31.7	9.5	6.3	0.0	
	周年値	11.1	0.0	1.4	1.5	5.7	14.1	7.3	13.0	0.5	
	周年比	43.2	－	1135.7	0.0	56.1	224.8	130.1	48.5	0.0	
発 生 株 率	発生程度	やや少	少	多	少	やや少	多	周年並	やや少	少	
	発生株数	1	0	27	0	6	126	11	3	0	
	本年値	0.1	0.0	1.7	0.0	0.4	8.0	0.7	0.2	0.0	
	周年値	0.3	0.0	0.2	0.0	0.5	3.1	0.3	0.7	0.0	
概 評	周年比	33.3	－	850.0	－	80.0	258.1	233.3	28.6	－	
	発生程度	やや少	少	多	少	周年並	多	多	やや少	少	
概 評		やや少	(少)	多	少	やや少	多	(やや多)	やや少	(少)	

注) 概評の()は、指定有害動植物・重要病害虫以外の概評または発生程度(本年値と周年値の比較)が-となっているものの概評を示す

トマト

単位: %

		灰色 かび 病	疫病	葉か び病	すす かび 病	うどん こ病	黄化 葉巻 病	黄化 病	モザ イク 病	青枯 病	萎凋 病	アブラ ムシ 類	コナジ ラミ類 (葉率)	アザミ ウマ類 (花率)	ハモグ リハエ 類幼虫	タバコ ガ類幼 虫	トマト キバガ	備考
ほ場率	発生ほ場数	0	0	0	1	0	2	2	0	0	0	0	6	0	0	0	0	総調査ほ場数：19か所
	本年値	0.0	0.0	0.0	5.3	0.0	10.5	10.5	0.0	0.0	0.0	0.0	31.6	0.0	0.0	0.0	0.0	総調査株数：950株
	平年値	0.0	3.3	1.8	13.4	1.4	12.1	7.1	0.0	0.0	0.0	0.0	30.1	0.0	3.6	0.0	0.0	(調査数:50株、100花・果・葉かび・すすかび 150葉、その他100葉)
	平年比	－	0.0	0.0	39.6	0.0	86.8	147.9	－	－	－	－	105.0	－	0.0	－	－	※本年値＝本年の地点ごとの調査結果の平均 値を示す
葉率・ 株率	発生程度	少	少	少	やや少	少	平年並	やや多	少	少	少	少	平年並	少	少	少	少	※平年比＝(本年値／平年値)×100
	発生株数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0	※タバコガ類幼虫および被害は2016.6～。 以前は幼虫調査のため、平年値は参考値。
	本年値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	
	平年値	0.0	0.2	0.0	2.6	0.1	0.2	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	0.0	0.1	0.0	0.0	
概 評	平年比	－	0.0	－	0.0	0.0	0.0	0.0	－	－	－	－	72.2	－	0.0	－	－	
	発生程度	少	少	少	少	少	少	少	少	少	少	少	平年並	少	少	少	少	
		少	少	少	やや少	少	やや少	(平年並)	(少)	(少)	(少)	(少)	平年並	(少)	少	少	(少)	(少)

注) 概評の()は、指定有害動植物・重要病害虫以外の概評または発生程度(本年値と周年値の比較)が-となっているものの概評を示す

きゅうり

単位: %

		灰色か び病 (株率)	べと 病	うどん こ病	褐斑 病	疫病 (株率)	モザイク 病 (株率)	黄化え そ病 (株率)	炭疽 病	斑点 細菌 病	アブラム シ類	アザミ ウマ類	ハモグリ ハエ類 幼虫	コナジ ラミ類	ハダニ 類	ハモンヨ トウ幼 虫 (株率)	備考
ほ場率	発生ほ場数	0	3	1	3	0	0	1	3	0	1	0	1	3	0	0	総調査ほ場数：5か所
	本年値	0.0	60.0	20.0	60.0	0.0	0.0	20.0	60.0	0.0	20.0	0.0	20.0	60.0	0.0	0.0	総調査葉数：500葉
	平年値	0.0	53.0	41.4	25.0	0.0	3.0	17.5	0.0	0.0	5.2	18.0	10.8	66.9	2.2	7.7	総調査株数：125株
	平年比	—	113.2	48.3	240.0	—	0.0	114.3	—	—	384.6	0.0	185.2	89.7	0.0	0.0	
葉率・ 株率	発生程度	少	平年並	やや少	多	少	少	平年並	—	少	多	少	多	平年並	少	少	※平年比＝(本年値÷平年値)×100
	発生葉・株数	0	50	6	112	0	0	2	31	0	60	0	2	38	0	0	※本年値は本年の地点ごとの調査結果の平均値を示す
	本年値	0.0	10.0	1.2	22.4	0.0	0.0	1.6	6.2	0.0	12.0	0.0	0.4	7.6	0.0	0.0	※灰色かび病はH26年度から、ハモンヨトウ幼虫はH28年度から、疫病、モザイク病、黄化えそ病はH29年度から株率調査。それ以前の平年値は参考値。炭疽病、斑点細菌病はR5年度から調査。
	平年値	0.0	8.6	7.5	2.1	0.0	0.0	5.5	0.0	0.0	0.1	0.9	0.6	18.2	0.0	0.2	
	平年比	—	116.3	16.0	1066.7	—	—	29.1	—	—	12000.0	0.0	66.7	41.8	—	0.0	
	発生程度	少	平年並	少	多	少	少	やや少	—	少	多	少	平年並	やや少	少	少	
概 評		(少)	平年並	やや少	多	(少)	(少)	平年並	(多)	(少)	やや多	少	やや多	平年並	(少)	(少)	

注) 概評の()は、指定有害動植物・重要病害虫以外の概評または発生程度(本年値と周年値の比較)が-となっているものの概評を示す

ねぎ

単位: %

		さび病	べと病	黒斑症 状	軟腐病	萎縮病	アブラ ムシ類	アザミ ウマ類	ハモグ リハエ 類幼虫	ハスモ ンヨト ウ幼虫	ネギコ ガ幼虫	シロイ チモジ ヨトウ 幼虫	備考
ほ場率	発生ほ場数	0	0	8	0	0	0	2	2	0	0	1	総調査ほ場数：8か所
	本年値	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	25.0	25.0	0.0	0.0	12.5	総調査株数：400株
	平年値	12.7	0.0	91.3	2.7	0.0	0.0	53.2	30.4	8.8	1.3	27.1	(調査株数 50株)
	平年比	0.0	-	109.5	0.0	-	-	47.0	82.2	0.0	0.0	46.1	
	発生程度	少	少	平年並	少	少	少	やや少	平年並	少	少	やや少	※平年比＝（平均値／平年値）×100
株率	発生株数	0	0	223	0	0	0	10	18	0	0	4	※調査株数にカウントされるほどではないが、ほ場内で発生が見られる場合は散見として発生ほ場数にカウント
	本年値	0.0	0.0	55.8	0.0	0.0	0.0	2.5	4.5	0.0	0.0	1.0	
	平年値	0.3	0.0	17.0	0.0	0.0	0.0	15.5	2.7	0.2	0.1	4.0	
	平年比	0.0	-	328.2	-	-	-	16.1	166.7	0.0	0.0	25.0	
	発生程度	少	少	多	少	少	少	少	やや多	少	少	やや少	※シロイチモジヨトウ幼虫はR2年度から調査
概 評		少	(少)	やや多	(少)	(少)	(少)	やや少	平年並	(少)	(少)	やや少	

にら

単位：％

		白斑葉枯病	乾腐病	さび病	株腐細菌病	ネダニ類	アザミウマ類	備考
ほ場率	発生ほ場数	0	1	0	0	0	0	総調査ほ場数：11か所 総調査株数：550株 （調査株数 50株） ※平年比＝（平均値／平年値）×100 ※株率の平年値は過去10年の値 ※本年値は、本年の地点ごとの調査結果の平均値を示す ※調査株数にカウントされるほどではないが、ほ場内で発生が見られる場合は散見として発生ほ場数にカウント
	本年値	0.0	9.1	0.0	0.0	0.0	0.0	
	平年値	4.3	0.0	6.1	0.0	4.3	9.0	
	平年比	0.0	－	0.0	－	0.0	0.0	
	発生程度	少	－	少	少	少	少	
株率	発生株数	0	3	0	0	0	0	
	本年値	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	
	平年値	0.1	0.0	0.9	0.0	0.1	0.8	
	平年比	0.0	－	0.0	－	0.0	0.0	
	発生程度	少	－	少	少	少	少	
概 評		少	(平年並)	(少)	(少)	少	少	

注) 概評の()は、指定有害動植物・重要病害虫以外の概評または発生程度(本年値と平年値の比較)が-となっているものの概評を示す

きく

単位：％

		白さび病	アブラムシ類	ハダニ類	アザミウマ類	ハスモンヨトウ	シロイチモジヨトウ	備考
ほ場率	発生ほ場数	0	1	2	0	0	0	総調査ほ場数：8か所 総調査株数：400株 （調査株数 50株） ※本年値＝本年の地点ごとの調査結果の平均値を示す ※平年比＝（平均値／平年値）×100 ※調査株数にカウントされるほどではないが、ほ場内で発生が見られる場合は散見として発生ほ場数にカウント
	本年値	0.0	12.5	25.0	0.0	0.0	0.0	
	平年値	3.3	12.2	69.2	6.6	7.1	0.0	
	平年比	0.0	102.5	36.1	0.0	0.0	－	
	発生程度	少	平年並	やや少	少	少	少	
株率	発生株数	0	42	58	0	0	0	
	本年値	0.0	10.5	14.5	0.0	0.0	0.0	
	平年値	0.6	1.3	19.0	0.2	0.1	0.0	
	平年比	0.0	807.7	76.3	0.0	0.0	－	
	発生程度	少	多	平年並	少	少	少	
概 評		少	やや多	やや少	少	(少)	(少)	

注) 概評の()は、発生程度(本年値と平年値の比較)が-となっているものの概評を示す