

水稻(8月上旬)

単位: %

Table with columns for pest types (葉いもち, 葉いもち上位3葉, etc.) and rows for occurrence rates (発生ほ場率, 発生株率) and degrees (発生程度) for various regions (県全体, 県北部, etc.).

* 葉いもち・紋枯病は100株、縞葉枯病・ごま葉枯病・白葉枯病・心枯茎・イネツトムシは300株調査
※ 心枯茎: ニカメイガの被害によるものを調査した

水田におけるすくい取り(8月上旬)

Table showing sampling results for various pests like クモヘリ, ホソハリ, アカヒゲ, アカスジ, etc., including occurrence counts and rates.

Table showing sampling results for various pests like ウンカ類, ヒメトビ, セジロウ, ヨコバイ, ツマグロ, etc., including occurrence counts and rates.

大豆

	べと病	カメムシ類 成虫(頭数)	カメムシ類 幼虫(頭数)	ハスモンヨ トウ (発生の有無)	その他ヨ ウ目幼虫 (頭数)	フタスジヒ メハムシ (頭数)	アブラムシ 類 (株数)	シロイチモ ジヨトウ (頭数)	コガネムシ 類 (株数)	備考
発生ほ場数(か所)	22	7	2	8	18	1	11	1	0	総調査ほ場数: 25か所
ほ場率 (%)	本年平均値	88.0	28.0	8.0	32.0	72.0	4.0	44.0	4.0	総調査株数: 625株
	平年値	67.0	16.2	1.4	18.4	65.3	11.7	31.0	0.0	(調査株数: 1ほ場25株)
	平年比	131.3	172.8	571.4	173.9	110.3	34.2	141.9	-	0.0
	発生程度	平年並	やや多	多	やや多	平年並	やや少	やや多	-	少
頭数又は株数合計(頭、株)	411	28	2	-	61	2	32	1	0	※調査株数にカウントされるほどではないが、ほ場内で発生が見られる場合は散見として発生ほ場数にカウント
頭数 株率 (%)	本年平均値	16.4	1.1	0.3	-	2.4	0.1	1.3	0.2	0.0
	平年値	8.7	0.2	0.0	-	1.8	0.3	0.9	0.0	0.1
	平年比	188.5	550.0	-	-	133.3	33.3	144.4	-	0.0
	発生程度	多	多	-	-	平年並	やや少	やや多	-	少
概 評	やや多	やや多	多	やや多	平年並	やや少	やや多	やや多	少	

※) べと病の平年値は、定点ほ作付け品種が全て「里のほほえみ」となった平成27(2015)年~令和4(2022)年の9か年平均で算出
 ※) ハスモンヨトウは卵塊、幼虫のいる白変葉、幼虫の有無を調査

いちご(育苗)

単位: %

	炭疽病	灰色か び病	うどん こ病	萎黄病	アブラ ムシ類	ハダニ 類	コナジ ラミ類	ハスモ ンヨト ウ幼虫	シロイ チモジ ヨトウ 幼虫	備考
発生ほ場数	3	0	0	0	10	13	0	0	0	総調査ほ場数: 58か所 総調査株数: 1,450株 (調査株数 25株)
ほ場率	本年値	5.2	0.0	0.0	0.0	17.2	22.4	0.0	0.0	
	平年値	6.2	0.0	3.6	0.2	14.3	22.8	2.1	1.8	0.0
	平年比	83.9	-	0.0	0.0	120.3	98.2	0.0	0.0	-
	発生程度	平年並	少	少	少	平年並	平年並	少	少	少
発生株 率	発生株数	4	0	0	0	45	64	0	0	
	本年値	0.3	0.0	0.0	0.0	3.1	4.4	0.0	0.0	0.0
	平年値	0.1	0.0	0.2	0.0	2.2	4.7	0.1	0.0	0.0
	平年比	300.0	-	0.0	-	140.9	93.6	0.0	-	-
発生程度	多	少	少	少	やや多	平年並	少	少	少	※調査株数にカウントされるほどではないが、ほ場内で発生が見られる場合は散見として発生ほ場数にカウント
概 評	やや多	少	少	少	平年並	平年並	少	少	少	

注) 概評の()は、指定有害動植物・重要病害虫以外の概評または発生程度(本年値と平年値の比較)が-となっているものの概評を示す

トマト

単位: %

	灰色か び病	疫病	葉か び病	すす かび病	うどん こ病	黄化 葉巻 病	モザ イク 病	青枯 病	萎凋 病	アブラ ムシ 類	コナ ジラ ミ類 (葉 率)	アザ ミウ マ類 (花 率)	ハモ グリ バエ 類幼 虫	タバ コ類 幼虫 および 被害	ハス モン ヨト ウ幼 虫	備考	
発生ほ場数	0	0	0	2	3	2	0	0	0	1	4	0	2	1	0	総調査ほ場数: 7か所	
ほ場率	本年値	0.0	0.0	0.0	28.6	42.9	28.6	0.0	0.0	14.3	57.1	0.0	28.6	14.3	0.0	総調査株数: 350株	
	平年値	3.6	0.0	25.3	39.8	38.4	7.9	0.0	-	2.0	61.2	0.0	13.2	15.8	0.0	(調査数: 50株・100花・果・葉かび・すすかび150葉、その他100葉)	
	平年比	0.0	-	0.0	71.9	111.7	362.0	-	-	-	715.0	93.3	-	216.7	90.5	-	夏秋トマト
	発生程度	少	少	少	平年並	平年並	多	少	少	少	多	平年並	少	多	平年並	少	※本年値 = 本年の地点ごとの調査結果の平均値を示す ※平年比 = (本年値 / 平年値) × 100
葉率・ 株率	発生株数	0	0	0	16	18	3	0	0	15	168	0	3	2	0	※タバコ類幼虫および被害は2016.6~。以前は幼虫調査のため、平年値は参考値。	
	本年値	0.0	0.0	0.0	4.6	5.1	0.9	0.0	0.0	4.3	24.0	0.0	0.9	0.6	0.0	※コナジラミ類は2014年以降は葉率。以前は株率のため、平年値は参考	
	平年値	0.7	0.0	15.4	16.2	12.1	2.0	0.0	-	0.0	9.6	0.0	1.7	0.4	0.0	※調査株数にカウントされるほどではないが、ほ場内で発生が見られる場合は散見として発生ほ場数にカウント	
	平年比	0.0	-	0.0	28.4	42.1	45.0	-	-	-	250.0	-	52.9	150.0	-		
発生程度	少	少	少	やや少	やや少	やや少	少	少	少	-	多	少	やや少	やや多	少		
概 評	少	少	少	平年並	平年並	やや多	少	少	少	(***)	やや多	少	やや多	平年並	少		

注) 概評の()は、指定有害動植物・重要病害虫以外の概評または発生程度(本年値と平年値の比較)が-となっているものの概評を示す

きゆうり

単位：%

		灰色かび病(株率)	べと病	うどんこ病	褐斑病	疫病(株率)	すすび病(株率)	黄化えそ病(株率)	炭疽病	斑点細菌病	アブラムシ類	アザミウマ類	ハダニ類	コナジラミ類	ハダニ類	ハシロイデ目幼虫(株率)	備考
ほ場率	発生ほ場数	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	4	0	0	総調査ほ場数：4か所
	本年値	0.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0	0.0	100.0	0.0	0.0	総調査葉数：400葉
	平年値	3.3	49.7	66.0	14.5	0.0	5.0	32.7	-	-	0.0	29.7	0.0	35.2	0.0	0.0	総調査株数：100株
	平年比	0.0	50.3	0.0	0.0	-	0.0	0.0	-	-	-	168.4	-	284.1	-	-	(調査葉数 100葉)
葉率・株率	発生程度	少	やや少	少	少	少	少	少	-	-	少	やや多	少	多	少	少	(調査株数 25株)
	発生葉・株数	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	23	0	41	0	0	※平年比=(本年値/平年値)×100 [本年値は本年の地点ごとの調査結果の平均値を示す]
	本年値	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.8	0.0	10.3	0.0	0.0	0.0	※灰色かび病はH26年度から、ハシロイデ目幼虫はH28年度から、疫病、モザイク病、黄化えそ病はH29年度から株率調査。それ以前の平年値は参考値。炭疽病、斑点細菌病はH6年度から調査。
	平年値	0.1	6.6	7.5	0.9	0.0	0.0	2.9	-	-	0.0	1.6	0.0	2.2	0.0	0.0	※調査株数にカウントされるほどではないが、ほ場内で発生が見られる場合は散見として発生ほ場数にカウント
概 評	発生程度	少	少	少	少	少	少	少	-	-	少	多	少	多	少	少	
	発生程度	(少)	やや少	少	少	少	少	少	(少)	(少)	少	やや多	(少)	多	少	少	

注) 概評の()は、指定有害動植物・重要病害虫以外の概評または発生程度(本年値と平年値の比較)が-となっているものの概評を示す

なす

単位：%

		うどんこ病	灰色かび病(葉率)	青枯病	半身萎凋病	輪紋病	すすび病(葉率)	アブラムシ類	ハダニ類(葉率)	アザミウマ類(葉率)	ハシロイデ目幼虫(葉率)	コナジラミ類(葉率)	ハダニ類(葉率)	コナジラミ類(葉率)	ハシロイデ目幼虫(葉率)	備考
ほ場率	発生ほ場数	1	0	1	0	0	0	3	3	6	1	0	3	2	5	総調査ほ場数：8か所
	本年値	12.5	0.0	12.5	0.0	0.0	0.0	37.5	37.5	75.0	12.5	0.0	37.5	25.0	62.5	総調査株数：400株
	平年値	29.4	0.0	5.7	3.3	0.0	4.9	29.3	38.5	58.8	3.3	-	10.1	2.2	69.1	(調査数 50株、100葉、100果)
	平年比	42.5	-	219.3	0.0	-	0.0	128.0	97.4	127.6	378.8	-	371.3	1136.4	90.4	※平年比=(平均値/平年値)×100
株率・葉率	発生程度	やや少	少	多	少	少	少	平年並	平年並	平年並	多	少	多	多	平年並	※シロイデ目幼虫は2016年度から調査開始。灰色かび病・アザミウマ類・ハシロイデ目幼虫は2016年以降、すすび病・ハダニ類・コナジラミ類の密度は2014年以降葉率。以前は株率調査。タバコガ類幼虫被害率調査は2016年以降。以前は幼虫株率調査のため、平年値は参考値。
	発生株・葉数	1	0	3	0	0	0	7	31	24	1	0	9	2	43	
	本年値	0.3	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	1.8	3.9	3.0	0.1	0.0	1.1	0.5	5.4	
	平年値	3.7	0.0	0.2	0.1	0.0	0.5	2.7	4.3	9.5	0.0	-	0.3	0.1	4.7	
概 評	発生程度	少	少	多	少	少	少	平年並	平年並	やや少	多	少	多	多	平年並	※調査株数にカウントされるほどではないが、ほ場内で発生が見られる場合は散見として発生ほ場数にカウント
	発生程度	やや少	少	やや多	少	(少)	少	平年並	平年並	平年並	やや多	少	多	多	平年並	

注) 概評の()は、指定有害動植物・重要病害虫以外の概評または発生程度(本年値と平年値の比較)が-となっているものの概評を示す

ねぎ

単位：%

		さび病	べと病	黒斑症状	軟腐病	萎縮病	アブラムシ類	アザミウマ類	ハダニ類	ハシロイデ目幼虫	ハスモンヨトウ幼虫	ネギコガ幼虫	シロイデ目幼虫	備考
ほ場率	発生ほ場数	1	0	8	0	0	0	3	0	0	0	0	2	総調査ほ場数：8か所
	本年値	12.5	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	37.5	0.0	0.0	0.0	0.0	25.0	総調査株数：400株
	平年値	14.5	1.3	96.1	0.0	0.0	0.0	68.2	1.3	0.0	1.3	0.0	0.0	(調査株数 50株)
	平年比	86.2	0.0	104.1	-	-	-	55.0	0.0	-	0.0	-	-	※平年比=(平均値/平年値)×100
株率	発生程度	平年並	少	平年並	少	少	少	やや少	少	少	少	少	-	※調査株数にカウントされるほどではないが、ほ場内で発生が見られる場合は散見として発生ほ場数にカウント
	発生株数	0	0	199	0	0	0	68	0	0	0	0	1	
	本年値	0.0	0.0	49.8	0.0	0.0	0.0	17.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	
	平年値	2.2	0.0	28.0	0.0	0.0	0.0	45.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
概 評	発生程度	少	少	やや多	少	少	少	やや少	少	少	少	少	-	※シロイデ目幼虫はR2年度から調査
	発生程度	やや少	少	平年並	少	少	少	やや少	少	少	少	少	(多)	

注) 概評の()は、指定有害動植物・重要病害虫以外の概評または発生程度(本年値と平年値の比較)が-となっているものの概評を示す

なし

単位：%

		黒星病	黒星病(果実)	黒斑病	赤星病	輪紋病(果実)	ハダニ類	ハマキムシ類被害枝率	サビダニ類被害枝率	アブラムシ類被害枝率	シンクイムシ類(果実)	カメムシ類(果実)	備考
ほ場率	発生ほ場数	4	1	0	1	0	15	0	2	2	0	5	総調査ほ場数：27か所
	本年値	14.8	3.7	0.0	3.7	0.0	55.6	0.0	7.4	7.4	0.0	18.5	総調査葉数：10,800葉
	平年値	14.8	19.5	0.0	9.6	0.0	23.3	3.3	57	6.7	0.4	3.0	(調査葉数 400葉)
	平年比	100.0	19.0	-	38.5	-	238.6	0.0	12.9	110.4	0.0	616.7	総調査枝・果実数：2,700枝・果実
葉率・果率・枝率	発生程度	平年並	少	少	やや少	少	多	少	少	平年並	少	多	(調査枝・果実数 100枝・果実)
	発生葉数	3	1	0	0	0	906	0	36	6	0	3	※平年比=(平均値/平年値)×100
	本年値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.4	0.0	1.3	0.2	0.0	0.1	※本年値=本年の地点ごとの調査結果の平均値を示す
	平年値	0.1	0.3	0.0	0.1	0.0	0.6	0.1	20.5	0.1	0.0	0.0	※サビダニ類被害枝率はH27年度から調査開始
概 評	発生程度	少	少	少	少	少	多	少	少	多	少	-	※ハマキムシ類被害枝率はH26年度から調査開始以前は葉での幼虫調査
	発生程度	やや少	少	少	やや少	少	多	少	少	やや多	少	(多)	※調査株数にカウントされるほどではないが、ほ場内で発生が見られる場合は散見として発生ほ場数にカウント

注) 概評の()は、指定有害動植物・重要病害虫以外の概評または発生程度(本年値と平年値の比較)が-となっているものの概評を示す

ぶどう

単位：%

		べと病 (葉)	晩腐病 (花穂)	黒とう病 (花穂)	褐斑病 (葉)	灰色か び病 (葉)	アブラ ムシ類 (葉)	ハダニ 類 (葉)	備考
ほ場率	発生ほ場数	2	0	1	0	0	0	0	総調査ほ場数：10か所
	本年値	20.0	0.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	総調査葉・花穂数：1,000葉・花穂
	平年値	27.0	11.5	4.2	20.3	0.0	0.0	1.1	(調査葉・花穂数：100葉・花穂)
	平年比	74.1	0.0	238.1	0.0	-	-	0.0	※平年比=(本年平均値/平年値)×100
葉・花穂率	発生程度	平年並	少	多	少	少	少	少	※本年値=本年の地点ごとの調査結果の平均値を示す
	発生葉数	11	0	0	0	0	0	0	
	本年値	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	平年値	1.8	1.1	1.3	5.3	0.0	0.0	0.0	※調査株数にカウントされるほどではないが、ほ場内で発生が見られる場合は散見として発生ほ場数にカウント
概 評	平年比	61.1	0.0	0.0	0.0	-	-	-	
	発生程度	平年並	少	少	少	少	少	少	
概 評		平年並	少	平年並	(少)	少	少	少	

注) 概評の()は、指定有害動植物・重要病害虫以外の概評または発生程度(本年値と平年値の比較)が-となっているものの概評を示す

りんご

単位：%

		斑点落 葉病	赤星病	褐斑病	黒星病	輪紋病 (果実)	ハダ ニ類	ハマキ ムシ類 幼虫	アブラ ムシ類	シンクイ ムシ類 (果実)	備考
ほ場率	発生ほ場数	6	0	7	0	0	1	0	1	0	総調査ほ場数：7か所
	本年値	85.7	0.0	100.0	0.0	0.0	14.3	0.0	14.3	0.0	総調査葉数：2,800葉
	平年値	44.3	0.0	47.4	0.0	2.9	11.0	2.9	16.7	0.0	(調査葉数 400葉)
	平年比	193.5	-	211.0	-	0.0	130.0	0.0	85.6	-	(調査果実数 100果)
葉率	発生程度	多	少	多	少	少	平年並	少	平年並	少	※平年比=(本年平均値/平年値)×100
	発生葉数	40	0	64	0	0	36	0	12	0	※本年値=本年の地点ごとの調査結果の平均値を示す
	本年値	1.4	0.0	2.3	0.0	0.0	1.3	0.0	0.4	0.0	
	平年値	0.7	0.0	0.9	0.0	0.0	1.7	0.1	0.4	0.0	※黒星病はH28年度から調査
概 評	平年比	200.0	-	255.6	-	-	76.5	0.0	100.0	-	※調査株数にカウントされるほどではないが、ほ場内で発生が見られる場合は散見として発生ほ場数にカウント
	発生程度	多	少	多	少	少	平年並	少	平年並	少	
概 評		多	少	多	少	少	平年並	少	平年並	少	

注) 概評の()は、指定有害動植物・重要病害虫以外の概評または発生程度(本年値と平年値の比較)が-となっているものの概評を示す

きく

単位：%

		白さび病	アブラム シ類	ハダニ類	アザミウ マ類	ハモグリ バエ類	コナジラ ミ類	ハスモン ヨトウ	備考
ほ場率	発生ほ場数	0	2	8	1	0	1	0	総調査ほ場数：9か所
	本年値	0.0	22.2	88.9	11.1	0.0	11.1	0.0	総調査株数：450株
	平年値	6.4	8.1	60.1	9.3	0.0	2.1	0.0	(調査株数 50株)
	平年比	0.0	274.1	147.9	119.4	-	528.6	-	
株率	発生程度	少	多	やや多	平年並	少	多	少	※本年値=本年の地点ごとの調査結果の平均値を示す
	発生株数	0	11	90	1	0	1	0	※平年比=(平均値/平年値)×100
	本年値	0.0	2.4	20.0	0.2	0.0	0.2	0.0	
	平年値	1.3	1.0	20.3	0.9	0.0	0.0	0.0	※調査株数にカウントされるほどではないが、ほ場内で発生が見られる場合は散見として発生ほ場数にカウント
概 評	平年比	0.0	240.0	98.5	22.2	-	-	-	
	発生程度	少	多	平年並	やや少	少	-	少	※シロイテモジヨトウの発生はなかった。
概 評		少	多	やや多	平年並	(少)	(やや多)	少	

注) 概評の()は、指定有害動植物・重要病害虫以外の概評または発生程度(本年値と平年値の比較)が-となっているものの概評を示す