

水稲(6月下旬~7月上旬)

単位：%

| | 葉いもち | 紋枯病 | 縞葉枯病 | 心枯れ茎 | イネドロオウムシ | イネツトムシ | ごま葉枯病 | 白葉枯病 | 備考 |
|-----------------|-------|-------|--------|-------|----------|--------|-------|------|---|
| 県全体発生ほ場率 | 10.5 | 2.6 | 28.9 | 7.9 | 18.4 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 令和6年6月下旬 総調査ほ場数：76 ※ $年平均比 = (発生ほ場率 / 平年値) \times 100$ ※調査株数にカウントされるほどではないが、ほ場内で発生が見られる場合は散見として発生ほ場数にカウント ごま葉枯病、白葉枯病はR5年度以降調査のため平年値なし |
| 平年値 | 8.0 | 1.9 | 26.5 | 6.8 | 22.1 | 14.0 | - | - | |
| 平年比 | 131.5 | 136.8 | 109.4 | 116.0 | 83.3 | 9.4 | - | - | |
| 発生程度 | 平年並 | 平年並 | 平年並 | 平年並 | 平年並 | 少 | - | - | |
| 県全体発生株率 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 総調査ほ場数：30 |
| 平年値 | 0.1 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | - | - | |
| 平年比 | 60.2 | 278.9 | 51.4 | 884.9 | 73.1 | 10.2 | - | - | |
| 発生程度 | 平年並 | 多 | やや少 | 多 | 平年並 | 少 | - | - | |
| 県北部発生株率 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 総調査ほ場数：26 |
| 平年値 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | - | - | |
| 平年比 | 400.0 | - | 5666.7 | - | 7.0 | 0.0 | - | - | |
| 発生程度 | 多 | 少 | 多 | - | 少 | 少 | - | - | |
| 県中部発生株率 | 0.0 | 0.4 | 0.2 | 1.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 総調査ほ場数：20 |
| 平年値 | 0.1 | 0.0 | 0.5 | 0.1 | 1.0 | 0.1 | - | - | |
| 平年比 | 0.0 | 912.6 | 32.9 | 901.3 | 84.1 | 0.0 | - | - | |
| 発生程度 | 少 | 多 | やや少 | 多 | 平年並 | 少 | - | - | |
| 県南部発生株率 | 0.1 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 総調査ほ場数：20 |
| 平年値 | 0.2 | 0.2 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | |
| 平年比 | 62.5 | 0.0 | 32.4 | - | 0.0 | 37.0 | - | - | |
| 発生程度 | 平年並 | 少 | やや少 | 少 | (多) | やや少 | - | - | |
| 概 評 | 平年並 | やや多 | 平年並 | やや多 | 平年並 | 少 | - | - | |

葉いもち・紋枯病は100株、縞葉枯病、ごま葉枯病、白葉枯病、心枯れ茎、イネドロオウムシ・イネツトムシは300株調査

水稲(7月中旬)

単位：%

| | 葉いもち | 紋枯病 | 縞葉枯病 | 心枯れ茎 | イネツトムシ | ごま葉枯病 | 白葉枯病 | 備考 |
|-----------------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|------|--|
| 県全体発生ほ場率 | 28.9 | 9.2 | 47.4 | 15.8 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 令和6年7月8~11日調査 総調査ほ場数：76 ※ $年平均比 = (発生ほ場率 / 平年値) \times 100$ ※調査株数にカウントされるほどではないが、ほ場内で発生が見られる場合は散見として発生ほ場数にカウント ごま葉枯病、白葉枯病はR5年度以降調査のため平年値なし |
| 平年値 | 28.1 | 12.9 | 40.5 | 10.8 | 6.3 | - | - | |
| 平年比 | 103.1 | 71.1 | 116.9 | 146.6 | 20.9 | - | - | |
| 発生程度 | 平年並 | 平年並 | 平年並 | やや多 | やや少 | - | - | |
| 県全体発生株率 | 0.6 | 1.6 | 0.9 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 総調査ほ場数：30 |
| 平年値 | 1.4 | 0.7 | 0.9 | 0.1 | 0.0 | - | - | |
| 平年比 | 42.6 | 216.2 | 102.3 | 400.0 | 0.0 | - | - | |
| 発生程度 | やや少 | 多 | 平年並 | 多 | 少 | - | - | |
| 県北部発生株率 | 0.7 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 総調査ほ場数：26 |
| 平年値 | 1.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | - | - | |
| 平年比 | 65.4 | 0.0 | 333.3 | 0.0 | 0.0 | - | - | |
| 発生程度 | 平年並 | 少 | 多 | 少 | 少 | - | - | |
| 県中部発生株率 | 0.3 | 1.7 | 0.8 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 総調査ほ場数：20 |
| 平年値 | 1.2 | 0.5 | 1.0 | 0.2 | 0.0 | - | - | |
| 平年比 | 25.4 | 369.6 | 82.5 | 450.0 | 0.0 | - | - | |
| 発生程度 | やや少 | 多 | 平年並 | 多 | 少 | - | - | |
| 県南部発生株率 | 0.9 | 3.5 | 2.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 総調査ほ場数：20 |
| 平年値 | 1.4 | 1.4 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | - | - | |
| 平年比 | 62.5 | 255.5 | 80.8 | - | 0.0 | - | - | |
| 発生程度 | 平年並 | 多 | 平年並 | 少 | 少 | - | - | |
| 概 評 | 平年並 | やや多 | 平年並 | やや多 | やや少 | - | - | |

* 葉いもち・紋枯病は100株、縞葉枯病・ごま葉枯病・白葉枯病・心枯れ茎・イネツトムシは300株調査

雑草等における斑点米カメムシ類すくい取り(6月下旬)

| | クモヘリカメムシ | | ホソハリカメムシ | | カスミカメ類 | | | 斑点米カメムシ類合計 | | |
|-------------|-----------------------------|-----|----------|-------|---|----------------------------|---------------------|------------|---------------------------|--|
| | 幼虫 | 成虫 | 幼虫 | 成虫 | アカヒゲ ホソド リカスミ カメムシ 幼虫・ アカス ジカスミ カメムシ 幼虫 | イネホソ ミドリカ スミカメ 成虫 | アカスジ カスミカ メ成虫 | | | |
| 発生地点数(か所) | 0 | 2 | 7 | 17 | 31 | 33 | 30 | 38 | 総調査地点数：40 (20回振りすくい取り) | |
| 生 点 率 | 本年 [A] (%) | 0.0 | 5.0 | 17.5 | 42.5 | 77.5 | 82.5 | 75.0 | | 95.0 |
| | 平 年 [B] (%) | 0.0 | 3.8 | 8.1 | 37.1 | 63.9 | 90.9 | 72.6 | | 99.5 |
| | 平年比 (%) (([A] / [B]) × 100) | - | 133.2 | 216.3 | 114.4 | 121.4 | 90.7 | 103.3 | | 95.5 |
| 発生程度 | 少 | 平年並 | 多 | 平年並 | 平年並 | 平年並 | 平年並 | 平年並 | 平年並 | |
| 頭 数 | すくい取り頭数合計(頭) | 0 | 2 | 12 | 39 | 1958 | 620 | 698 | 3491 | 10か年の平均値 (平成26(2014)年~ 令和5(2023)年) |
| | 本年平均 [C] (頭) | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 1.0 | 49.0 | 15.5 | 17.5 | 87.3 | |
| | 平 年 [D] (頭) | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.8 | 27.2 | 19.7 | 11.3 | 64.6 | |
| | 平年比 (%) (([C] / [D]) × 100) | - | 104.0 | 193.5 | 115.8 | 180.2 | 78.6 | 154.3 | 135.1 | |
| 発生程度 | 少 | 平年並 | 多 | 平年並 | 多 | 平年並 | やや多 | 平年並 | | |
| 概 評 | | 平年並 | 平年並 | 平年並 | 多 | やや多 | 平年並 | 平年並 | | |

雑草地等における斑点米カメムシ類すくい取り(7月中旬)

| | クモヘリカメムシ | | | ホソハリカメムシ | | | カスミカメ類 | | | | 斑点米カメムシ類合計 | | |
|-----------|-------------------|-----|------|----------|-------|-------|------------------|------------------|-------------|----------|------------|----------------------------|--------------------------|
| | 幼虫 | 成虫 | 成幼虫 | 幼虫 | 成虫 | 成幼虫 | アカヒゲホソミドリカスミカメ幼虫 | アカヒゲホソミドリカスミカメ成虫 | アカスジカスミカメ成虫 | カスミカメ類合計 | | | |
| 発生地点数(か所) | 0 | 12 | 12 | 12 | 26 | 28 | 26 | 24 | 25 | 32 | 33 | 総調査地点数: 33 (20回振りすくい取り) | |
| 発生地点率 | 本年[A](%) | 0.0 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 78.8 | 84.8 | 78.8 | 72.7 | 75.8 | 84.8 | | 100.0 |
| | 平年[B](%) | 1.1 | 36.7 | 36.7 | 24.6 | 67.3 | 71.4 | 87.9 | 89.3 | 87.3 | 97.3 | | 99.7 |
| | ([A] / [B]) × 100 | 0.0 | 99.2 | 99.2 | 147.5 | 117.0 | 118.9 | 89.6 | 81.5 | 86.8 | 87.2 | | 100.3 |
| 発生程度 | 少 | 平年並 | 平年並 | やや多 | 平年並 | 平年並 | 平年並 | 平年並 | 平年並 | 平年並 | 平年並 | 平年並 | 平年値: |
| 頭数 | すくい取り頭数合計(頭) | 0 | 392 | 392 | 44 | 148 | 192 | 10973 | 1521 | 1794 | 14245 | 15293 | 10か年の平均値 (2014~2023年) |
| | 本年平均[C](頭) | 0.0 | 11.9 | 11.9 | 1.3 | 4.5 | 5.8 | 332.5 | 46.1 | 54.4 | 431.7 | 463.4 | |
| | 平年[D](頭) | 0.0 | 20.2 | 20.3 | 0.8 | 2.9 | 3.7 | 148.2 | 48.5 | 39.0 | 227.0 | 254.3 | |
| | ([C] / [D]) × 100 | 0.0 | 58.7 | 58.7 | 169.8 | 155.2 | 158.3 | 224.4 | 95.0 | 139.4 | 190.1 | 182.2 | |
| 発生程度 | 少 | やや少 | やや少 | やや多 | やや多 | やや多 | 多 | 平年並 | 平年並 | 多 | 多 | 多 | |
| 概評 | 平年並 | | | 平年並 | | | やや多 | | | | やや多 | | |

水田における斑点米カメムシ類すくい取り(7月上旬)

| | クモヘリカメムシ | | ホソハリカメムシ | | アカヒゲホソミドリカスミカメ | | アカスジカスミカメ | | 斑点米カメムシ類成幼虫 | うちカスミカメ類成幼虫 | 備考 | |
|-----------|-------------------|-----|----------|-----|----------------|-----|-----------|-----|-------------|-------------|------------------------------|------|
| | 幼虫 | 成虫 | 幼虫 | 成虫 | 幼虫 | 成虫 | 幼虫 | 成虫 | | | | |
| 発生ほ場数(か所) | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 総調査ほ場数: 39ほ場 (20回振りすくい取り) | |
| 発生ほ場率 | 発生ほ場率[A](%) | 0.0 | 5.1 | 0.0 | 2.6 | 0.0 | 5.1 | 0.0 | 12.8 | 5.1 | | |
| | 発生ほ場率平年値[B](%) | 0.0 | 5.6 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 5.6 | 0.3 | 0.5 | 12.1 | | 6.4 |
| | ([A] / [B]) × 100 | - | 91.1 | - | 866.7 | 0.0 | 91.1 | 0.0 | 0.0 | 105.8 | | 79.7 |
| 発生程度 | 少 | 平年並 | 少 | 多 | 少 | 平年並 | 少 | 少 | 平年並 | 平年並 | 平年値はH26(2014)~R5(2023)年の平均 | |
| 頭数 | すくい取り頭数合計(頭) | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | |
| | 本年平均値[C](頭) | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | |
| | 平年値[D](頭) | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.1 | |
| | ([C] / [D]) × 100 | - | 50.0 | - | - | - | 100.0 | - | - | 66.7 | 100.0 | |
| 発生程度 | 少 | やや少 | 少 | 少 | 少 | 平年並 | 少 | 少 | 平年並 | 平年並 | | |
| 概評 | 平年並 | | 平年並 | | 平年並 | | 少 | | 平年並 | 平年並 | | |

水田すくい取り(7月中旬)

| | ウンカ類幼虫 | ヒメトビウンカ成虫 | セジロウンカ成虫 | ヨコバイ類幼虫 | ツマグロヨコバイ成虫 | イナズマヨコバイ成虫 | イナゴ | イネミズゾウムシ | フタオビコヤガ幼虫 | イチモンジセセリ幼虫 | 備考 | |
|-------|-------------------|-----------|----------|---------|------------|------------|-------|----------|-----------|------------|----------------------------|---|
| | 発生ほ場数(か所) | 17 | 35 | 2 | 1 | 7 | 1 | 25 | 7 | 0 | | 0 |
| 発生ほ場率 | 発生ほ場率[A](%) | 43.6 | 89.7 | 5.1 | 2.6 | 17.9 | 2.6 | 79.5 | 20.5 | 0.0 | 0.0 | |
| | 発生ほ場率平年値[B](%) | 66.6 | 86.1 | 4.1 | 7.8 | 29.3 | 0.8 | 61.9 | 4.9 | 6.4 | 1.3 | |
| | ([A] / [B]) × 100 | 65.5 | 104.2 | 124.4 | 33.3 | 61.1 | 325.0 | 128.4 | 418.4 | 0.0 | 0.0 | |
| 発生程度 | 平年並 | 平年並 | 平年並 | やや少 | 平年並 | 多 | 平年並 | 多 | 少 | 少 | 平年値はH26(2014)~R5(2023)年の平均 | |
| 頭数 | すくい取り頭数合計(頭) | 59 | 447 | 3 | 1 | 12 | 1 | 255 | 59 | 0 | 0 | |
| | 本年平均値[C](頭) | 1.5 | 11.5 | 0.1 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 6.5 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | |
| | 平年値[D](頭) | 20.6 | 15.8 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 0.0 | 7.5 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | |
| | ([C] / [D]) × 100 | 7.3 | 72.6 | 150.0 | 0.0 | 36.3 | 0.0 | 86.7 | 2166.7 | 0.0 | 0.0 | |
| 発生程度 | 少 | 平年並 | やや多 | 少 | やや少 | 少 | 平年並 | 多 | 少 | 少 | | |
| 概評 | やや少 | 平年並 | 平年並 | やや少 | 平年並 | 平年並 | 平年並 | 多 | 少 | 少 | | |

いちご(育苗床・親株)

| | 炭疽病 | 灰色かび病 | うどんこ病 | 萎黄病 | アブラムシ類 | ハダニ類 | コナジラミ類 | ハスモンヨトウ幼虫 | シロイチモジヨトウ幼虫 | 備考 | |
|------|-------|-------|-------|------|--------|-------|--------|-----------|-------------|--|---|
| | 発生ほ場数 | 2 | 0 | 12 | 1 | 12 | 16 | 2 | 0 | | 0 |
| ほ場率 | 本年値 | 3.6 | 0.0 | 21.4 | 1.8 | 21.4 | 28.6 | 3.6 | 0.0 | 0.0 | |
| | 平年値 | 1.4 | 0.0 | 32.1 | 0.2 | 13.6 | 29.9 | 12.2 | 0.4 | 0.0 | |
| | 平年比 | 257.1 | - | 66.7 | 900.0 | 157.4 | 95.7 | 29.5 | 0.0 | - | |
| 発生程度 | 多 | 少 | 平年並 | 多 | やや多 | 平年並 | やや少 | 少 | 少 | ※本年値=本年の地点ごとの調査結果の平均値を示す ※平年比=(本年値/平年値) × 100 | |
| 発生株率 | 発生株数 | 5 | 0 | 50 | 0 | 39 | 85 | 13 | 0 | 0 | |
| | 本年値 | 0.4 | 0.0 | 3.6 | 0.0 | 2.8 | 6.1 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | |
| | 平年値 | 0.0 | 0.0 | 5.3 | 0.0 | 2.2 | 7.5 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | |
| | 平年比 | - | - | 67.9 | - | 127.3 | 81.3 | 100.0 | - | - | |
| 発生程度 | - | 少 | 平年並 | 少 | 平年並 | 平年並 | 平年並 | 少 | 少 | ※調査株数にカウントされるほどではないが、ほ場内で発生が見られる場合は散見として発生ほ場数にカウント | |
| 概評 | 多 | 少 | 平年並 | 平年並 | やや多 | 平年並 | やや少 | 少 | 少 | | |

注) 概評の()は、指定有害動植物・重要病害虫以外の概評または発生程度(本年値と平年値の比較)がとっているものの概評を示す

トマト

単位：%

| | | 灰色かび病 | 疫病 | 葉かび病 | すすかび病 | うどんこ病 | 黄化葉巻病 | モザイク病 | 青枯病 | 萎凋病 | アブラムシ類 | コナジラミ類(葉率) | アザミウマ類(花率) | ハモグリバエ類幼虫 | タバコガ類幼虫および被害 | ハスモンヨトウ幼虫 | 備考 |
|-------|-------|-------|-----|------|-------|-------|-------|-------|-----|-----|--------|------------|------------|-----------|--------------|-----------|---|
| ほ場率 | 発生ほ場数 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 総調査ほ場数：11か所 総調査株数：550株 (調査数:50株、100花・果、葉かび・すすかび150葉、その他100葉) 夏秋トマト ※本年値＝本年の地点ごとの調査結果の平均値を示す |
| | 本年値 | 9.1 | 0.0 | 9.1 | 0.0 | 54.5 | 18.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 72.7 | 27.3 | 18.2 | 9.1 | 0.0 | | |
| | 平年値 | 1.9 | 1.8 | 14.4 | 20.1 | 52.6 | 4.8 | 0.0 | - | - | 3.6 | 36.4 | 4.6 | 14.0 | 7.7 | 0.0 | |
| | 発生程度 | 多 | 少 | 平年並 | 少 | 平年並 | 多 | 少 | 少 | 少 | 少 | 多 | 多 | 平年並 | 平年並 | 少 | |
| 葉率・株率 | 発生株数 | 1 | 0 | 5 | 0 | 109 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 | 24 | 2 | 1 | 0 | ※平年比＝(本年値/平年値)×100 ※タバコガ類幼虫および被害は2016.6～、以前は幼虫調査のため、平年値は参考値。 ※コナジラミ類は2014年以降は葉率。以前は株率のため、平年値は参考値。 ※調査株数にカウントされるほどではないが、ほ場内で発生が見られる場合は散見として発生ほ場数にカウント |
| | 本年値 | 0.2 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 19.8 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.8 | 2.2 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | | |
| | 平年値 | 0.0 | 0.4 | 5.1 | 5.1 | 11.9 | 1.5 | 0.0 | - | - | 0.1 | 2.1 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.0 | |
| | 発生程度 | - | 少 | 少 | 少 | やや多 | 少 | 少 | 少 | 少 | 少 | 多 | 多 | やや少 | 平年並 | 少 | |
| 概 評 | | (やや多) | 少 | やや少 | 少 | 平年並 | 平年並 | 少 | 少 | 少 | 少 | 多 | 多 | 平年並 | 平年並 | 少 | |

注) 概評の()は、指定有害動植物・重要病害虫以外の概評または発生程度(本年値と平年値の比較)が-となっているものの概評を示す

なす

単位：%

| | | うどんこ病 | 灰色かび病(葉率) | 青枯病 | 半身萎凋病 | 輪紋病 | すすかび病(葉率) | アブラムシ類 | ハジメ類(葉率) | アザミウマ類(葉率) | ハスモンヨトウ幼虫(葉率) | シロイチモジトウ幼虫(葉率) | ハモグリバエ類幼虫(果率) | コナジラミ類成幼虫(葉率) | 備考 | |
|-------|--------|-------|-----------|-----|-------|-----|-----------|--------|----------|------------|---------------|----------------|---------------|---------------|------|--|
| ほ場率 | 発生ほ場数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 総調査ほ場数：8か所 総調査株数：400株 (調査数 50株、100葉、100果) ※平年比＝(平均値/平年値)×100 ※シロイチモジトウは2016年度から調査開始。灰色かび病・アザミウマ類・ハスモンヨトウ幼虫は2016年以降、すすかび病・ハダニ類・コナジラミ類の密度は2014年以降葉率。以前は株率調査。タバコガ類幼虫被害率調査は2016年以降、以前は幼虫株率調査のため、平年値は参考値。 |
| | 本年平均値 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 37.5 | 62.5 | 87.5 | 0.0 | 0.0 | 37.5 | 0.0 | 50.0 | |
| | 平年値 | 11.1 | 1.1 | 0.0 | 2.2 | 0.0 | 1.1 | 25.6 | 45.1 | 72.0 | 1.1 | - | 6.7 | 3.3 | 59.2 | |
| | 発生程度 | 少 | 少 | 少 | 少 | 少 | 少 | やや多 | 平年並 | 平年並 | 少 | 少 | 多 | 少 | 平年並 | |
| 株率・葉率 | 発生株・葉数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 45 | 68 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15 | ※調査株数にカウントされるほどではないが、ほ場内で発生が見られる場合は散見として発生ほ場数にカウント |
| | 本年平均値 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.8 | 5.6 | 8.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1.9 | |
| | 平年値 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 3.9 | 9.6 | 0.0 | - | 0.2 | 0.0 | 2.0 | |
| | 発生程度 | 少 | 少 | 少 | 少 | 少 | 少 | 多 | やや多 | 平年並 | 少 | 少 | 多 | 少 | 平年並 | |
| 概 評 | | 少 | 少 | 少 | 少 | (少) | 少 | やや多 | 平年並 | 平年並 | 少 | 少 | 多 | 少 | 平年並 | |

注) 概評の()は、指定有害動植物・重要病害虫以外の概評または発生程度(本年値と平年値の比較)が-となっているものの概評を示す

きゅうり

単位：%

| | | 灰色かび病(株率) | べと病 | うどんこ病 | 褐斑病 | 疫病(株率) | モザイク病(株率) | 黄化えそ病(株率) | 炭疽病 | 斑点細菌病 | アブラムシ類 | アザミウマ類 | ハモグリバエ類幼虫 | ハスモンヨトウ幼虫 | ネギコガ幼虫 | シロイチモジトウ幼虫 | 備考 |
|-------|--------|-----------|------|-------|------|--------|-----------|-----------|-------|-------|--------|--------|-----------|-----------|--------|------------|--|
| ほ場率 | 発生ほ場数 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 総調査ほ場数：6か所 総調査葉数：600葉 総調査株数：150株 (調査葉数 100葉) (調査株数 25株) |
| | 本年値 | 0.0 | 66.7 | 66.7 | 16.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.7 | 0.0 | 16.7 | 16.7 | 0.0 | 50.0 | 33.3 | 0.0 | |
| | 平年値 | 0.0 | 70.9 | 68.2 | 8.4 | 0.0 | 4.2 | 22.9 | - | - | 0.0 | 31.6 | 2.5 | 33.0 | 5.6 | 0.0 | |
| | 発生程度 | 少 | 平年並 | 平年並 | 多 | 少 | 少 | 少 | - | - | - | やや少 | 少 | やや多 | 多 | 少 | |
| 葉率・株率 | 発生葉・株数 | 0 | 210 | 34 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 7 | 0 | 20 | 61 | 0 | ※平年比＝(本年値/平年値)×100 [本年値は本年の地点ごとの調査結果の平均値を示す] ※灰色かび病はH26年度から、ハスモンヨトウはH28年度から、疫病、モザイク病、黄化えそ病はH29年度から株率調査。それ以前の平年値は参考値。炭疽病、斑点細菌病はR5年度から調査。 ※調査株数にカウントされるほどではないが、ほ場内で発生が見られる場合は散見として発生ほ場数にカウント |
| | 本年値 | 0.0 | 35.0 | 5.7 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.3 | 1.2 | 0.0 | 3.3 | 10.2 | 0.0 | |
| | 平年値 | 0.0 | 19.2 | 13.6 | 1.8 | 0.0 | 0.1 | 3.9 | - | - | 0.0 | 4.7 | 0.0 | 1.7 | 0.7 | 0.0 | |
| | 発生程度 | 少 | 多 | やや少 | やや少 | 少 | 少 | 少 | - | - | - | やや少 | 少 | 多 | 多 | 少 | |
| 概 評 | | (少) | やや多 | 平年並 | やや多 | 少 | 少 | 少 | (やや多) | (少) | やや多 | やや少 | (少) | やや多 | 多 | 少 | |

注) 概評の()は、指定有害動植物・重要病害虫以外の概評または発生程度(本年値と平年値の比較)が-となっているものの概評を示す

ねぎ

単位：%

| | | さび病 | べと病 | 黒斑症状 | 軟腐病 | 萎縮病 | アブラムシ類 | アザミウマ類 | ハモグリバエ類幼虫 | ハスモンヨトウ幼虫 | ネギコガ幼虫 | シロイチモジトウ幼虫 | 備考 |
|-----|-------|------|------|------|-----|-----|--------|--------|-----------|-----------|--------|------------|--|
| ほ場率 | 発生ほ場数 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 総調査ほ場数：8か所 総調査株数：400株 (調査株数 50株) ※平年比＝(平均値/平年値)×100 |
| | 本年平均値 | 62.5 | 12.5 | 75.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 75.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| | 平年値 | 50.5 | 11.4 | 77.3 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 69.8 | 2.7 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | |
| | 発生程度 | 平年並 | 平年並 | 平年並 | 少 | 少 | 少 | 平年並 | 少 | 少 | 少 | 少 | |
| 株率 | 発生株数 | 63 | 18 | 155 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | ※調査株数にカウントされるほどではないが、ほ場内で発生が見られる場合は散見として発生ほ場数にカウント ※シロイチモジトウ幼虫はR2年度から調査 |
| | 本年平均値 | 15.8 | 4.5 | 38.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| | 平年値 | 12.8 | 0.7 | 11.9 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 45.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| | 発生程度 | 平年並 | 多 | 多 | 少 | 少 | 少 | 平年並 | 少 | 少 | 少 | 少 | |
| 概 評 | | 平年並 | やや多 | やや多 | 少 | 少 | 少 | 平年並 | 少 | 少 | 少 | (少) | |

注) 概評の()は、指定有害動植物・重要病害虫以外の概評または発生程度(本年値と平年値の比較)が-となっているものの概評を示す

なし

単位：%

| | | 黒星病 | 黒星病(果実) | 黒斑病 | 赤星病 | 輪紋病(果実) | ハダニ類 | ハマキムシ類被害枝率 | サビダニ類被害枝率 | アブラムシ類寄生枝率 | シンクイムシ類(果実) | カメムシ類(果実) | 備考 |
|----------|-------|-------|---------|-----|--------|---------|-------|------------|-----------|------------|-------------|-----------|--|
| ほ場率 | 発生ほ場数 | 4 | 3 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 総調査ほ場数：28か所 |
| | 本年平均値 | 14.3 | 10.7 | 0.0 | 28.6 | 0.0 | 21.4 | 0.0 | 17.9 | 21.4 | 0.0 | 0.0 | 総調査葉数：11,200葉 |
| | 平年値 | 18.0 | 11.7 | 0.7 | 12.5 | 0.0 | 5.5 | 1.5 | 49 | 24.0 | 0.4 | 0.7 | (調査葉数 400葉) |
| | 平年比 | 79.4 | 91.5 | 0.0 | 228.8 | - | 389.1 | 0.0 | 36.4 | 89.2 | 0.0 | 0.0 | 総調査枝・果実数：2,700枝・果実 |
| 葉率・果率・枝率 | 発生程度 | 平年並 | 平年並 | 少 | 多 | 少 | 多 | 少 | やや少 | 平年並 | 少 | 少 | (調査枝・果実数 100枝・果実) |
| | 発生葉数 | 10 | 1 | 0 | 233 | 0 | 365 | 0 | 94 | 142 | 0 | 0 | |
| | 本年平均値 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 2.1 | 0.0 | 3.3 | 0.0 | 3.4 | 5.1 | 0.0 | 0.0 | ※平年比＝(平均値/平年値)×100 |
| | 平年値 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 16.5 | 3.7 | 0.0 | 0.0 | ※サビダニ類被害枝率はH27年度から調査開始 |
| 概 評 | 平年比 | 100.0 | 0.0 | - | 2100.0 | - | - | 0.0 | 20.6 | 137.8 | - | - | ※ハマキムシ類被害枝率はH26年度から調査開始以前は葉での幼虫調査 |
| | 発生程度 | 平年並 | 少 | 少 | 多 | 少 | - | 少 | やや少 | 平年並 | 少 | 少 | ※調査株数にカウントされるほどではないが、ほ場内で発生が見られる場合は散見として発生ほ場数にカウント |

注) 概評の()は、指定有害動植物・重要病害虫以外の概評または発生程度(本年値と平年値の比較)が-となっているものの概評を示す

ぶどう

単位：%

| | | べと病(葉) | 晩腐病(花穂) | 黒とう病(花穂) | 褐斑病(葉) | 灰色かび病(葉) | アブラムシ類(葉) | ハダニ類(葉) | 備考 |
|-------|-------|--------|---------|----------|--------|----------|-----------|---------|--|
| ほ場率 | 発生ほ場数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 総調査ほ場数：8か所 |
| | 本年平均値 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 総調査葉・花穂数：800葉・花穂 |
| | 平年値 | 3.1 | 1.3 | 8.2 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | (調査葉・花穂数：100葉・花穂) |
| | 平年比 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | 0.0 | ※平年比＝(本年平均値/平年値)×100 |
| 葉・花穂率 | 発生程度 | 少 | 少 | 少 | 少 | 少 | 少 | 少 | |
| | 発生葉数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 本年平均値 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ※調査株数にカウントされるほどではないが、ほ場内で発生が見られる場合は散見として発生ほ場数にカウント |
| | 平年値 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 概 評 | 平年比 | - | - | 0.0 | 0.0 | - | - | - | |
| | 発生程度 | 少 | 少 | 少 | 少 | 少 | 少 | 少 | |

注) 概評の()は、指定有害動植物・重要病害虫以外の概評または発生程度(本年値と平年値の比較)が-となっているものの概評を示す

りんご

単位：%

| | | 斑点落葉病 | 赤星病 | 褐斑病 | 黒星病 | 輪紋病(果実) | ハダニ類 | ハマキムシ類幼虫 | アブラムシ類 | シンクイムシ類(果実) | 備考 |
|-----|-------|-------|-----|--------|-----|---------|------|----------|--------|-------------|--|
| ほ場率 | 発生ほ場数 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 総調査ほ場数：7か所 |
| | 本年平均値 | 100.0 | 0.0 | 71.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 総調査葉数：2,800葉 |
| | 平年値 | 34.1 | 2.9 | 19.8 | 0.0 | 0.0 | 8.8 | 0.0 | 6.7 | 0.0 | (調査葉数 400葉) |
| | 平年比 | 293.3 | 0.0 | 360.6 | - | - | 0.0 | - | 0.0 | - | (調査果実数 100果) |
| 葉率 | 発生程度 | 多 | 少 | 多 | 少 | 少 | 少 | 少 | 少 | 少 | ※平年比＝(本年平均値/平年値)×100 |
| | 発生葉数 | 59 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ※黒星病はH28年度から調査 |
| | 本年平均値 | 2.1 | 0.0 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| | 平年値 | 0.4 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 概 評 | 平年比 | 525.0 | - | 1100.0 | - | - | 0.0 | - | - | - | ※調査株数にカウントされるほどではないが、ほ場内で発生が見られる場合は散見として発生ほ場数にカウント |
| | 発生程度 | 多 | 少 | 多 | 少 | 少 | 少 | 少 | 少 | 少 | |

注) 概評の()は、指定有害動植物・重要病害虫以外の概評または発生程度(本年値と平年値の比較)が-となっているものの概評を示す

きく

単位：%

| | | 白さび病 | アブラムシ類 | ハダニ類 | アザミウマ類 | ハモグリバエ類 | コナジラミ類 | ハスモンヨトウ | 備考 |
|-----|-------|------|--------|-------|--------|---------|--------|---------|--|
| ほ場率 | 発生ほ場数 | 0 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 総調査ほ場数：10か所 |
| | 本年値 | 0.0 | 50.0 | 60.0 | 10.0 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 総調査株数：500株 |
| | 平年値 | 10.7 | 8.2 | 53.0 | 18.2 | 0.0 | 1.1 | 1.0 | (調査株数 50株) |
| | 平年比 | 0.0 | 609.8 | 113.2 | 54.9 | - | 909.1 | 0.0 | |
| 株率 | 発生程度 | 少 | 多 | 平年並 | やや少 | 少 | 多 | 少 | ※本年値＝本年の地点ごとの調査結果の平均値を示す |
| | 発生株数 | 0 | 10 | 85 | 9 | 0 | 9 | 0 | ※平年比＝(平均値/平年値)×100 |
| | 本年値 | 0.0 | 2.0 | 17.0 | 1.8 | 0.0 | 1.8 | 0.0 | |
| | 平年値 | 1.7 | 1.0 | 13.2 | 3.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ※調査株数にカウントされるほどではないが、ほ場内で発生が見られる場合は散見として発生ほ場数にカウント |
| 概 評 | 平年比 | 0.0 | 200.0 | 128.8 | 56.3 | - | - | - | |
| | 発生程度 | 少 | 多 | 平年並 | やや少 | 少 | - | 少 | ※シロイチモジヨトウの発生はなかった。 |

注) 概評の()は、指定有害動植物・重要病害虫以外の概評または発生程度(本年値と平年値の比較)が-となっているものの概評を示す