

水稻(6月下旬)

単位：％								
	葉いもち	紋枯病	縹葉枯病	心枯れ茎	イネドロオイムシ	イネツトムシ	ごま葉枯病	白葉枯病
県全体発生ほ場率	0.0	0.0	24.6	8.2	9.8	1.6	0.0	0.0
平年値	9.4	1.8	24.0	5.9	20.5	10.9	－	－
平年比	0.0	0.0	102.4	140.1	48.0	15.0	－	－
発生程度	少	少	平年並	やや多	やや少	少	－	－
県全体発生株率	0.0	0.0	0.3	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
平年値	0.1	0.1	0.3	0.1	0.4	0.0	－	－
平年比	0.0	0.0	83.0	90.0	29.6	12.0	－	－
発生程度	少	少	平年並	平年並	やや少	少	－	－
概 評	少	少	平年並	やや多	やや少	少	－	－

※葉いもち・紋枯病は100株、縹葉枯病、ごま葉枯病、白葉枯病、心枯れ茎、イネドロオイムシ・イネツトムシは300株調査
(地域別調査結果)

単位：％								
地域	葉いもち	紋枯病	縹葉枯病	心枯れ茎	イネドロオイムシ	イネツトムシ	ごま葉枯病	白葉枯病
県北部発生株率	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
平年値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	－	－
平年比	0.0	－	262.2	－	0.0	82.4	－	－
発生程度	少	少	多	－	少	平年並	－	－
県中部発生株率	0.0	0.0	0.1	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0
平年値	0.1	0.1	0.3	0.2	1.0	0.1	－	－
平年比	0.0	0.0	35.5	8.3	34.6	0.0	－	－
発生程度	少	少	やや少	少	やや少	少	－	－
県南部発生株率	0.0	0.0	0.8	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0
平年値	0.2	0.1	0.8	0.0	0.0	0.0	－	－
平年比	0.0	0.0	97.8	－	0.0	0.0	－	－
発生程度	少	少	平年並	やや多	少	少	－	－

水稻(7月上旬)

単位：％					
	葉いもち	紋枯病	縹葉枯病	心枯れ茎	イネツトムシ
県全体発生ほ場率	3.2	7.9	36.5	4.8	0.0
平年値	28.6	12.6	38.4	12.9	3.6
平年比	11.1	62.8	95.0	36.9	0.0
発生程度	少	平年並	平年並	やや少	少
県全体発生株率	0.0	0.2	1.1	0.1	0.0
平年値	1.5	0.8	0.7	0.1	0.0
平年比	0.0	25.3	152.8	71.4	0.0
発生程度	少	やや少	やや多	平年並	少
概 評	少	平年並	平年並	やや少	少

* 葉いもち・紋枯病は100株、縹葉枯病・ごま葉枯病、白葉枯病・心枯れ茎・イネツトムシは300株調査
(地域別調査結果)

単位：％					
	葉いもち	紋枯病	縹葉枯病	心枯れ茎	イネツトムシ
県北部発生株率	0.0	0.1	0.2	0.1	0.0
平年値	0.7	0.0	0.3	0.0	0.0
平年比	0.0	－	66.7	－	－
発生程度	少	－	平年並	－	－
県中部発生株率	0.0	0.3	1.4	0.0	0.0
平年値	0.3	1.7	0.8	0.9	0.0
平年比	0.0	17.6	175.0	0.0	－
発生程度	少	少	やや多	少	－
県南部発生株率	0.0	0.1	2.0	0.3	0.0
平年値	0.9	3.5	2.1	0.2	0.0
平年比	0.0	2.9	95.2	150.0	－
発生程度	少	少	平年並	やや多	－

雑草地等における斑点米カメムシ類すくい取り調査結果(6月中旬)

		斑点米カメムシ類 合計	イネカメムシ			クモヘリカメムシ			ホソハリカメムシ			ミナミアオカメムシ			カスミカメ類				合計	
			幼虫	成虫	合計	幼虫	成虫	合計	幼虫	成虫	合計	幼虫	成虫	合計	イネホソ ミドリ・ アカスジ カスミカ メ幼虫	イネホソ ミドリ・ アカスミ カメ成虫	アカス ジカスミ カメ成虫			
発 生 地点率	発生地点数(か所)		38	0	0	0	0	0	0	6	15	18	0	0	0	27	23	26	33	総調査地点数：42 (20回振りすくい取り)
	本 年 [A] (%)		90.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.3	35.7	42.9	0.0	0.0	0.0	64.3	54.8	61.9	78.6	
	平 年 [B] (%)		98.5	0.0	0.5	0.5	0.0	4.0	3.7	9.4	39.6	42.4	0.0	1.0	1.0	56.2	86.7	71.2	96.1	
	([A] / [B]) × 100		91.8	-	0.0	0.0	-	0.0	0.0	151.6	90.1	101.1	-	0.0	0.0	114.5	63.1	86.9	81.8	
	発生程度		平年並	少	少	少	少	少	少	やや多	平年並	平年並	少	少	少	平年並	平年並	平年並	平年並	
頭 数	すくい取り頭数合計(頭)		1290	0	0	0	0	0	0	11	42	53	0	0	0	857	153	250	1237	平年値：10年の平均値 (2016～2025年) ※ イネカメムシとミナミアオ カメムシは2021年から調査
	本年平均 [C] (頭)		30.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.0	1.3	0.0	0.0	0.0	20.4	3.6	6.0	29.5	
	平 年 [D] (頭)		60.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.2	1.2	1.4	0.0	0.0	0.0	15.3	15.9	10.3	58.2	
	([C] / [D]) × 100		50.6	-	0.0	0.0	-	0.0	0.0	139.1	82.3	90.7	-	0.0	0.0	133.2	22.9	57.9	50.6	
	発生程度		やや少	少	少	少	少	少	少	平年並	平年並	平年並	少	少	少	平年並	やや少	やや少	やや少	
概 評			やや少	少			少			平年並			少			やや少				

注) 概評の()は、発生程度(本年値と平年値の比較)が－となっているものの概評を示す

雑草地等における斑点米カメムシ類すくい取り(7月上中旬)

		斑点米カメムシ類 合計	イネカメムシ			クモヘリカメムシ			ホソハリカメムシ			ミナミアオカメムシ			カスミカメ類				
			幼虫	成虫	合計	幼虫	成虫	合計	幼虫	成虫	合計	幼虫	成虫	合計	イネホソミドリ・アカスジカスミカメ幼虫	イネホソミドリ・アカスジカスミカメ成虫	アカスジカスミカメ成虫	合計	
発生地点数(か所)		41	0	6	6	0	12	12	17	29	31	5	2	6	34	31	33	36	総調査地点数: 42
発 生 率	本 年 [A] (%)	92.9	0.0	11.9	11.9	0.0	28.6	28.6	35.7	66.7	69.0	11.9	4.8	14.3	81.0	73.8	78.6	85.7	(20回振りすくい取り)
	平 年 [B] (%)	99.0	0.5	5.3	5.3	1.1	39.1	39.1	30.7	73.9	78.2	0.0	0.0	1.4	76.6	82.7	82.6	93.5	平年値:
	([A] / [B]) × 100	93.8	0.0	224.5	224.5	0.0	73.1	73.1	116.2	90.2	88.3	-	-	1047.6	105.7	89.3	95.1	91.7	10か年の平均値
	発生程度	平年並	少	多	多	少	平年並	平年並	平年並	平年並	平年並	-	-	多	平年並	平年並	平年並	平年並	※ イネカメムシとミナミアオカメムシは2021年から調査
頭 数	すくい取り頭数合計 (頭)	5096	0	9	9	0	162	162	45	112	157	11	6	17	2773	501	1345	4566	
	本年平均 [C] (頭)	120.9	0.0	0.2	0.2	0.0	3.9	3.9	0.9	2.5	3.4	0.3	0.1	0.4	66.0	11.9	32.0	108.7	
	平 年 [D] (頭)	333.3	0.0	0.1	0.1	0.0	26.1	26.1	1.0	3.8	4.8	0.0	0.0	0.0	124.0	51.8	51.1	297.3	
	([C] / [D]) × 100	36.3	0.0	157.1	151.5	0.0	14.8	14.8	83.5	66.6	70.2	823.1	-	1272.1	53.2	23.0	62.7	36.6	
	発生程度	やや少	少	やや多	やや多	少	少	少	平年並	平年並	平年並	-	-	多	やや少	やや少	平年並	やや少	
概 評		平年並	多			やや少			平年並			(多)			平年並				

注) 概評の()は、発生程度(本年値と平年値の比較)が-となっているものの概評を示す

水田における斑点米カメムシ類すくい取り調査結果(7月上旬)

		斑点米カメムシ類成幼虫	クモヘリカメムシ		ホソハリカメムシ		イネカメムシ		ミナミアオカメムシ		カスミカメシ類成幼虫	イネホソミドリ・アカスジカスミカメ成虫	アカスジカスミカメ成虫	イネホソミドリ・アカスジカスミカメ幼虫	備考
			幼虫	成虫	幼虫	成虫	幼虫	成虫	幼虫	成虫					
発生ほ場数(か所)		6	0	1	0	0	0	3	0	0	2	2	0	1	総調査ほ場数:32ほ場 (20回振りすくい取り) * 平年値はH27(2015)~R6(2024)年の平均
発 生 率	発 生 ほ 場 率 [A] (%)	18.8	0.0	3.1	0.0	0.0	0.0	9.4	0.0	0.0	6.3	6.3	0.0	3.1	
	発生ほ場率平年値 [B] (%)	14.4	0.0	6.8	0.0	0.6	0.0	1.9	0.0	0.0	6.6	5.4	0.9	0.0	
	([A] / [B]) × 100	130.6	-	45.6	-	0.0	-	494.7	-	-	95.5	116.7	0.0	-	
	発生程度	平年並	少	やや少	少	少	少	多	少	少	平年並	平年並	少	(多)	
頭 数	すくい取り頭数合計 (頭)	15	0	1	0	0	0	12	0	0	2	2	0	1	
	本年平均値 [C] (頭)	0.5	0.0	0.0	0.0	0.03	0.0	0.4	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.03	
	平年値 [D] (頭)	0.3	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	
	([C] / [D]) × 100	166.7	-	0.0	-	-	-	400.0	-	-	100.0	100.0	-	-	
	発生程度	やや多	少	少	少	-	少	多	少	少	平年並	平年並	少	(多)	
概 評		平年並	やや少		少		多		少		平年並	平年並	多	(多)	

注) 概評の()は、発生程度(本年値と平年値の比較)が-となっているものの概評を示す

水田すくい取り調査結果(7月上中旬)

		ウンカ類幼虫	ヒメトビウンカ成虫	セジロウンカ成虫	ヨコバイ類幼虫	ツマグロヨコバイ成虫	イナズマヨコバイ成虫	イナゴ	イネミズゾウムシ	フタオビコヤガ幼虫	イチモンジセリ幼虫	備考
発生ほ場数(か所)		21	26	0	0	3	1	15	0	4	0	総調査ほ場数:32ほ場 (20回振りすくい取り) * 平年値はH27(2015)~R6(2024)年の平均
発 生 率	発 生 ほ 場 率 [A] (%)	65.6	81.3	0.0	0.0	9.4	3.1	46.9	0.0	12.5	0.0	
	発生ほ場率平年値 [B] (%)	63.5	87.7	4.4	3.8	27.0	1.3	62.1	6.7	5.9	1.0	
	([A] / [B]) × 100	103.3	92.7	0.0	0.0	34.8	238.5	75.5	0.0	211.9	0.0	
	発生程度	平年並	平年並	少	少	やや少	多	平年並	少	多	少	
すくい取り頭数合計 (頭)		449	281	0	0	17	2	153	0	4	0	
頭 数	本年平均値 [C] (頭)	14.0	8.8	0.0	0.0	0.5	0.1	4.8	0.0	0.1	0.0	
	平年値 [D] (頭)	7.9	14.1	0.1	0.1	0.7	0.0	6.5	0.2	0.2	0.0	
	([C] / [D]) × 100	176.8	62.3	0.0	0.0	70.0	747.3	74.3	0.0	56.5	0.0	
	発生程度	やや多	平年並	少	少	平年並	多	平年並	少	やや少	少	
概 評		平年並	平年並	少	少	やや少	やや多	平年並	少	平年並	少	

注) 概評の()は、発生程度(本年値と平年値の比較)が-となっているものの概評を示す

いちご(育苗床・親株)

単位: %

		炭疽病	灰色かび病	うどんこ病	萎黄病	アブラムシ類	ハダニ類	コナジラミ類	ハスモンヨトウ幼虫	シロイチモジヨトウ幼虫	備考
ほ 場 率	発生ほ場数	0	0	31	0	11	13	6	1	0	総調査ほ場数: 54か所 総調査株数: 1,325株 (調査株数 25株) ※本年値=本年の地点ごとの調査結果の平均値を示す ※平年比=(本年値/平年値)×100 ※調査株数にカウントされるほどではないが、ほ場内で発生が見られる場合は散見として発生ほ場数にカウント
	本年値	0.0	0.0	57.4	0.0	20.4	24.1	11.1	1.9	0.0	
	平年値	1.4	0.0	25.3	0.4	14.3	27.2	8.9	0.6	0.0	
	平年比	0.0	-	226.9	0.0	142.7	88.6	124.7	316.7	-	
発 生 株 率	発生程度	少	少	多	少	やや多	平年並	平年並	多	少	
	発生株数	0	0	257	0	20	71	8	0	0	
	本年値	0.0	0.0	19.4	0.0	1.5	5.4	0.6	0.0	0.0	
	平年値	0.0	0.0	3.5	0.0	2.4	6.2	0.8	0.0	0.0	
	平年比	-	-	554.3	-	62.5	87.1	75.0	-	-	
	発生程度	少	少	多	少	平年並	平年並	平年並	やや多	少	
概 評		少	(少)	多	(少)	やや多	平年並	平年並	(やや多)	(少)	

注) 概評の()は、指定有害動植物・重要病害虫以外の概評または発生程度(本年値と平年値の比較)が-となっているものの概評を示す

トマト

単位：％

		灰色かび病	疫病	葉かび病	すすかび病	うどんこ病	黄化葉巻病	黄化病	モザイク病	青枯病	萎凋病	アブラムシ類	コナジラミ類(葉率)	アザミウマ類(花率)	ハモグリバエ類幼虫	タバコガ類幼虫	トマトキバガ	備考
ほ場率	発生ほ場数	1	0	0	0	8	1	4	0	1	0	0	5	0	0	0	1	総調査ほ場数：11か所 総調査株数：550株 (調査数:50株、100花・果、葉かび・すすかび150葉、その他100葉) ※夏秋トマト ※本年値＝本年の地点ごとの調査結果の平均値を示す ※平年比＝(本年値／平年値)×100 ※タバコガ類幼虫および被害は2016.6～。以前は幼虫調査のため、平年値は参考値。
	本年値	9.1	0.0	0.0	0.0	72.7	9.1	36.4	0.0	9.1	0.0	0.0	45.5	0.0	0.0	0.0	9.1	
	平年値	2.8	1.8	10.0	14.3	48.4	10.3	0.0	0.0	9.1	0.0	3.6	48.8	10.5	11.8	0.8	0.0	
	平年比	325.0	0.0	0.0	0.0	150.2	88.3	－	－	100.0	－	0.0	93.2	0.0	0.0	0.0	－	
	発生程度	多	少	少	少	やや多	平年並	－	少	平年並	少	少	平年並	少	少	少	－	
葉率・株率	発生株数	0	0	0	0	140	18	17	0	16	0	0	32	0	0	0	3	※平年比＝(本年値／平年値)×100 ※タバコガ類幼虫および被害は2016.6～。以前は幼虫調査のため、平年値は参考値。
	本年値	0.0	0.0	0.0	0.0	25.5	3.3	3.1	0.0	2.9	0.0	0.0	2.9	0.0	0.0	0.0	0.5	
	平年値	0.0	0.4	1.4	2.4	12.6	2.8	0.0	0.0	2.9	0.0	0.1	5.1	0.8	0.8	0.0	0.0	
	平年比	－	0.0	0.0	0.0	202.4	117.9	－	－	100.0	－	0.0	56.9	0.0	0.0	－	－	
	発生程度	少	少	少	少	多	平年並	－	少	平年並	少	少	やや少	少	少	少	－	
概 評		平年並	少	少	少	やや多	平年並	(やや多)	(少)	(平年並)	(少)	(少)	平年並	(少)	少	(少)	(やや多)	

注) 概評の()は、指定有害動植物・重要病害虫以外の概評または発生程度(本年値と平年値の比較)が-となっているものの概評を示す

なす

単位：％

		うどんこ病	灰色かび病(葉率)	青枯病	半身萎凋病	輪紋病	すすかび病(葉率)	アブラムシ類	ハニジミ類(葉率)	アザミウマ類(葉率)	ハモグリバエ類幼虫(葉率)	コナジラミ類幼虫(葉率)	アザミウマ類被害(葉率)	ハモグリバエ類幼虫	コナジラミ類成幼虫(葉率)	備考
ほ場率	発生ほ場数	0	0	0	0	0	0	5	2	7	0	0	0	0	4	総調査ほ場数：8か所 総調査株数：400株 (調査数 50株、100葉、100果) ※平年比＝(平均値／平年値)×100
	本年値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	62.5	25.0	87.5	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0	
	平年値	7.8	1.1	0.0	2.2	0.0	1.1	24.9	48.0	69.6	1.1	－	10.4	2.2	48.6	
	平年比	0.0	0.0	－	0.0	－	0.0	251.0	52.1	125.7	0.0	－	0.0	0.0	102.9	
	発生程度	少	少	少	少	少	少	多	やや少	平年並	少	少	少	少	平年並	
株率・葉率	発生株・葉数	0	0	0	0	0	0	17	34	40	0	0	0	0	10	※シロイチモジトウは2016年度から調査開始。灰色かび病・アザミウマ類・ハスモンヨトウ幼虫は2016年以降、すすかび病・ハダニ類・コナジラミ類の密度は2014年以降葉率。以前は株率調査。タバコガ類幼虫被害率調査は2016年以降、以前は幼虫株率調査のため、平年値は参考値。
	本年値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3	4.3	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	
	平年値	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	3.5	5.7	0.0	－	0.1	0.0	1.4	
	平年比	0.0	0.0	－	0.0	－	0.0	313.9	123.2	87.4	0.0	－	0.0	0.0	90.9	
	発生程度	少	少	少	少	少	少	多	平年並	平年並	少	少	少	少	平年並	
概 評		(少)	少	少	少	(少)	少	多	やや少	平年並	少	少	少	少	平年並	※調査株数にカウントされるほどではないが、ほ場内で発生が見られる場合は散見として発生ほ場数にカウント
		(少)	少	少	少	(少)	少	多	やや少	平年並	少	少	少	少	平年並	

注) 概評の()は、指定有害動植物・重要病害虫以外の概評または発生程度(本年値と平年値の比較)が-となっているものの概評を示す

ねぎ

単位：％

		さび病	べと病	黒斑症状	軟腐病	萎縮病	アブラムシ類	アザミウマ類	ハモグリバエ類幼虫	ハスモンヨトウ幼虫	ネギコガ幼虫	シロイチモジトウ幼虫	備考
ほ場率	発生ほ場数	2	0	6	0	0	0	6	1	0	0	0	総調査ほ場数：8か所 総調査株数：400株 (調査株数 50株) ※平年比＝(平均値／平年値)×100
	本年値	25.0	0.0	75.0	0.0	0.0	0.0	75.0	12.5	0.0	0.0	0.0	
	平年値	51.1	14.1	73.4	0.0	0.0	1.3	67.3	2.7	0.0	1.3	0.0	
	平年比	48.9	0.0	102.2	－	－	0.0	111.4	463.0	－	0.0	－	
	発生程度	やや少	少	平年並	少	少	少	平年並	多	少	少	少	
株率	発生株数	29	0	111	0	0	0	149	1	0	0	0	※調査株数にカウントされるほどではないが、ほ場内で発生が見られる場合は散見として発生ほ場数にカウント ※シロイチモジトウ幼虫はR2年度から調査
	本年値	7.3	0.0	27.8	0.0	0.0	0.0	37.3	0.3	0.0	0.0	0.0	
	平年値	12.3	1.2	14.6	0.0	0.0	0.1	40.7	0.1	0.0	0.0	0.0	
	平年比	59.3	0.0	190.4	－	－	0.0	91.6	300.0	－	－	－	
	発生程度	やや少	少	多	少	少	少	平年並	多	少	少	少	
概 評		やや少	少	やや多	少	少	少	平年並	やや多	少	少	少	※調査株数にカウントされるほどではないが、ほ場内で発生が見られる場合は散見として発生ほ場数にカウント
		やや少	少	やや多	少	少	少	平年並	やや多	少	少	少	

注) 概評の()は、指定有害動植物・重要病害虫以外の概評または発生程度(本年値と平年値の比較)が-となっているものの概評を示す

なし

単位：％

		黒星病	黒星病 (果実)	黒斑病	赤星病	ハダニ 類	ハマキ ムシ類 被害枝 率	アブラ ムシ類 寄生枝 率	シンク イムシ 類 (果実)	カメム シ類 (果実)	カイガ ラムシ 類 (果実)	備考
ほ場率	発生ほ場数	0	0	1	4	1	0	6	0	0	0	総調査ほ場数：24か所
	本年値	0.0	0.0	4.2	16.7	4.2	0.0	25.0	0.0	0.0	0.0	総調査葉数：9,600葉
	平年値	15.5	10.7	0.7	14.7	7.4	0.7	22.5	0.4	0.7	0.0	(調査葉数 400葉)
	平年比	0.0	0.0	600.0	113.6	56.8	0.0	111.1	0.0	0.0	－	総調査枝・果実数：2,600枝・果実
	発生程度	少	少	多	平年並	やや少	少	平年並	少	少	少	(調査枝・果実数 100枝・果実)
葉率・果 率・枝率	発生葉数	0	0	1	10	1	0	26	0	0	0	※平年比＝(平均値／平年値)×100
	本年値	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	1.1	0.0	0.0	0.0	※本年値＝本年の地点ごとの調査結果の平均値
	平年値	0.1	0.1	0.0	0.4	0.4	0.1	4.1	0.0	0.0	0.0	
	平年比	0.0	0.0	－	25.0	0.0	0.0	26.8	－	－	－	
	発生程度	少	少	少	やや少	少	少	やや少	少	少	少	
概 評		少	少	(平年並)	平年並	やや少	少	平年並	少	少	(少)	

注) 概評の()は、指定有害動植物・重要病害虫以外の概評または発生程度(本年値と平年値の比較)が-となっているものの概評を示す

ぶどう

単位：％

		べと病 (葉)	晩腐病 (花穂)	黒とう 病 (花穂)	灰色か び病 (葉)	ハマキ ムシ類 (花穂)	アザミ ウマ類 (花穂)	アブラ ムシ類 (葉)	ハダニ 類 (葉)	備考
ほ場率	発生ほ場数	0	0	0	0	0	0	0	0	総調査ほ場数：9か所
	本年値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	総調査葉・花穂数：900葉・花穂
	平年値	3.1	0.0	2.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	(調査葉・花穂数：100葉・花穂)
	平年比	0.0	－	0.0	－	－	－	－	－	※平年比＝(本年平均値／平年値)×100
	発生程度	少	少	少	少	少	少	少	少	※本年値＝本年の地点ごとの調査結果の平均値を示す
葉・花穂率	発生葉数	0	0	0	0	0	0	0	0	
	本年値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	平年値	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	※調査株数にカウントされるほどではないが、ほ場内で発生が見られる場合は散見として発生ほ場数にカウント
	平年比	－	－	0.0	－	－	－	－	－	
	発生程度	少	少	少	少	少	少	少	少	
概 評		少	少	少	(少)	(少)	少	(少)	(少)	

注) 概評の()は、指定有害動植物・重要病害虫以外の概評または発生程度(本年値と平年値の比較)が-となっているものの概評を示す

りんご

単位：％

		斑点落 葉病	赤星病	褐斑病	黒星病	輪紋病 (果実)	ハダニ 類	ハマキ ムシ類 幼虫	アブラ ムシ類	シンク イムシ 類 (果実)	カメム シ類 (果実)	備考
ほ場率	発生ほ場数	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	総調査ほ場数：7か所
	本年平均値	71.4	0.0	71.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	総調査葉数：2,800葉
	平年値	51.0	2.9	32.6	0.0	0.0	7.2	0.0	6.7	0.0	0.0	(調査葉数 400葉)
	平年比	140.0	0.0	219.0	－	－	0.0	－	0.0	－	－	(調査果実数 100果)
	発生程度	平年並	少	多	少	少	少	少	少	少	少	※平年比＝(本年平均値／平年値)×100
葉率	発生葉数	12	0	67	0	0	0	0	0	0	0	※黒星病はH28年度から調査
	本年平均値	0.4	0.0	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	※カメムシ類はR6年度から調査
	平年値	0.8	0.0	0.5	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	
	平年比	50.0	－	480.0	－	－	0.0	－	－	－	－	※調査株数にカウントされるほどではないが、ほ場内で発生が見られる場合は散見として発生ほ場数にカウント
	発生程度	やや少	少	多	少	少	少	少	少	少	少	
概 評		平年並	(少)	多	(少)	少	少	少	少	(少)	少	

注) 概評の()は、指定有害動植物・重要病害虫以外の概評または発生程度(本年値と平年値の比較)が-となっているものの概評を示す

きく

単位：％

		白さび病	アブラムシ 類	ハダニ類	アザミウマ 類	ハスモンヨ トモ	シロイチモ ジヨトウ	備考
ほ場率	発生ほ場数	0	0	2	0	0	0	総調査ほ場数：9か所
	本年値	0.0	0.0	22.2	0.0	0.0	0.0	総調査株数：450株
	平年値	9.4	13.1	51.2	14.3	1.0	0.0	(調査株数 50株)
	平年比	0.0	0.0	43.4	0.0	0.0	－	
	発生程度	少	少	やや少	少	少	少	※本年値＝本年の地点ごとの調査結果の平均値を示す
株率	発生株数	0	0	34	0	0	0	※平年比＝(平均値／平年値)×100
	本年値	0.0	0.0	7.6	0.0	0.0	0.0	
	平年値	1.4	1.4	13.7	1.4	0.0	0.0	※調査株数にカウントされるほどではないが、ほ場内で発生が見られる場合は散見として発生ほ場数にカウント
	平年比	0.0	0.0	55.5	0.0	－	－	
	発生程度	少	少	やや少	少	少	少	
概 評		少	少	やや少	少	(少)	(少)	

注) 概評の()は、発生程度(本年値と平年値の比較)が-となっているものの概評を示す